Non-CF bronchiektázie dospělých: stručný přehled pro praxi

Dokument Sekce chorob s bronchiální obstrukcí České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zuzana Antušová^{1,2}, Libor Fila³, Vladimír Herout⁴, Eva Kočová⁵, Kateřina Neumannová⁶, Jaromír Zatloukal⁷, Vladimír Koblížek²

¹Plicní ambulance, GEPAMED – NEXTCLINIC, Hradec Králové

²Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

³Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

⁴Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

⁵Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

⁶Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

⁷Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

Souhrn

Bronchiektázie (BE) reprezentují klinicky závažný, nicméně dosud málo pochopený pneumologický problém charakterizovaný rozšířením lumen a zesílením stěny bronchů. V globálním pohledu představují bronchiektázie výraznou příčinu morbiditu a mortality. Cílené úsilí směřované k časné diagnostice a detailnímu poznání příčinných souvislostí je v centru pozornosti respiračních specialistů v mnoha rozvinutých zemích Evropské unie. Riziková populace zahrnuje nemocné s perzistujícím nebo produktivním kašlem bez jiné zjištěné příčiny. Časná specifická kauzální léčba a nespécifická terapie zaměřená na zlepšení hygieny dolních dýchacích cest jsou schopny redukovat poškození plic. Na důkazech založené algoritmy protizánětlivé a antibiotické léčby však stále čekají na velké kontrolované studie. Plicní resekce jsou určeny pro symptomatické osoby s lokalizovaným postižením nereagujícím na ostatní neinvazivní postupy. Validních dat v oblasti bronchiektázií bez přítomnosti cystické fibrózy (non-CF BE) je stále málo. Ve snaze o získání rychlého přístupu k informacím o velkém počtu evropských nemocných a o rychlejší nábor nemocných do nových klinických studií vznikl v posledních letech Evropský registr bronchiektázií. Autoři tohoto dokumentu doporučují všem respiračním specialistům pečujícím o osoby s bronchiektáziemi aktivní participaci na tomto rozsáhlém a stále otevřeném projektu.

Klíčová slova: bronchiektázie – diagnostika – registr – terapie

Non-CF bronchiectasis of adults: short review for clinical practice

Position paper of Board of disease with bronchial obstruction Czech Pulmonological and Phthiseological Society Czech Medical Association of J. E. Purkyně

Summary

Bronchiectasis is a clinically important, but poorly understood, pulmonary condition characterized by dilated and thick-walled bronchi. Bronchiectasis remains a significant cause of morbidity and mortality around the world. Targeted effort to early high-resolution computed tomography diagnosis and detailed confirmation of causation are in the spotlight of respiratory physicians in the developed countries. The risk population consists of subjects with persistent and/or productive cough, where another clear diagnosis has not been performed. Specific treatment tailored on underlying diseases and non-specific airway clearance techniques are able to improve symptoms, and reduce lung impairment. Evidence-based treatment algorithms for anti-inflammatory, and antibiotic treatment of stable non-CF BE will have to await large-scale, long-term controlled studies. Surgery should be reserved for individuals with highly symptomatic, localized bronchiectasis who have failed medical management. Unfortunately, there have been few well designed longitudinal or cross-sectional studies in the field of bronchiectasis. To give truly meaningful and generalizable results, a longitudinal observational study of bronchiectasis would require to enrol several thousand patients, more than any one center can enrol. The European Bronchiectasis Registry will

create an open, pan-European registry of patients with non-CF bronchiectasis. The authors emphatically recommend that all respiratory specialist managed non-CF BE subjects should be actively involved in the European Bronchiectasis Registry.

Key words: bronchiectasis – diagnosis – registry – treatment

Úvod

Sekce chorob s bronchiální obstrukcí České pneumologické a fizeologické společnosti (ČPFS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně se od roku 2014 zabývá tvorbou pozičního dokumentu týkajícího se bronchiektázií bez přítomnosti cystické fibrózy (tzv. non-CF BE). Tato heterogenní skupina chorob je, bohužel, stále stranou zájmu lékařů nejen v České republice. Předkládaný dokument je souhrnem dostupných znalostí a důkazů akceptovaných mezinárodními autoritami na tomto poli [1–26]. Nejedná se o doporučený postup, nýbrž o stručný a poněkud simplifikovaný souhrn zaměřený na lékaře různých odborností. Hlavním důvodem pro publikaci tohoto dokumentu je nutnost položit základní kámen pro tvorbu národní strategie diagnostiky a léčby non-CF BE v blízké budoucnosti. Autoři dokumentu rovněž doporučují všem lékařům zainteresovaným v problematice non-CF BE aktivní zapojení do Evropského registru bronchiektázií (EMBARC – a pan-European network committed to promoting clinical research and education in bronchiectasis) [3].

Definice

Bronchiektázie (BE) jsou definovány jako ireverzibilní dilatace bronchů středního a malého kalibru, klinicky se zpravidla prezentující produktivním kašlem, dušností, únavou,

recidivujícími infekcemi dýchacích cest nebo hemoptýzou. Tento dokument nepojednává o BE asociovaných s cystickou fibrózou (CF) ani o tzv. trakčních BE přítomných při intersticiálních plicních procesech. V Evropě a USA mluvíme tedy o tzv. non-CF BE [1,9].

Epidemiologie

Vzhledem k nespecifickým klinickým projevům mohou být pacienti s bronchiektáziemi někdy sledováni pod jinou plicní diagnózou, např. jako nemocí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), s prostou chronickou bronchitidou nebo s průduškovým astmatem. Díky moderním zobrazovacím metodám, jako je vysokorozlišovací výpočetní tomografie (high-resolution computed tomography – HRCT) hrudníku, se však v posledních 2 dekadách daří poznat stále více klinických případů. I tak dosud zůstává přesná prevalence non-CF BE v ČR neznámá. Výskyt tohoto onemocnění obecně výrazně stoupá s rostoucím věkem [1,2,9]. V USA je odhadnuta prevalence tohoto onemocnění ve věkové kategorii 18–34 let 4,2/100 000 obyvatel, ve věkové kategorii > 75 let je to již 271/100 000 obyvatel [2].

Etiologie a patogeneze

Non-CF BE mohou být vrozené (vzácnější) nebo získané – spojené s jinou základní nemocí (tab. 1). Mezi nejčas-

Tab. 1. Nejčastější příčiny výskytu bronchiektázií (BE) u dospělých.* Upraveno podle [1,9]

příčiny BE	odhad zastoupení v populaci (v %)
idiopatické (bez zjištěné příčiny)**	30–53 %
postinfekční: nespecifické záněty dolních dýchacích cest nebo plic, respirační tuberkulóza (TB), netuberkulózní mykobakterií (NTM)	30–40 %
postaspirační nebo postinhalační (inzult musí být opakovaný)	4 %
systémová onemocnění pojiva: revmatoidní artritida (RA), systémový lupus erythematosus (SLE), Sjögrenův syndrom a další	3–6 %
průduškové astma – AB (vzácně), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jako součást vzájemného překryvu obou onemocnění, tzv. BCOS	AB 0–4 % CHOPN 15–30 %
cystická fibróza (CF)	3–4 %
vrozené poruchy ciliárního aparátu: syndrom primární ciliární dyskineze (PCD), Youngův syndrom	2 %
imunodeficity (primární/sekundární)	1–8 %
alergická bronchopulmonální mykóza (nejčastěji aspergilóza – ABPA)	1–7 %
nespecifické střevní záněty (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, celiakie)	1 %
vrozené abnormality bronchiálního stromu (Williamsův-Campbellův syndrom, Mounierův-Kuhnův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom a další)	1 %
jiné (syndrom žlutých nehtů, plicní sekvence)	raritní

*volně upraveno autory (sekundární tzv. trakční BE v terénu intersticiálních plicních chorob nejsou do tohoto výčtu zahrnuty)

**při pečlivějším vyšetření logicky klesá počet tzv. idiopatických forem BE [9]

tější příčiny vzniku non-CF BE patří recidivující, závažné respirační infekce, imunodeficity a opakované aspirace. V mnoha případech se však ani po podrobném vyšetření pacienta nepodaří základní příčinu vzniku non-CF BE objasnit. V tomto případě hovoříme o tzv. idiopatických non-CF BE (dle zahraničních literárních údajů se jedná až o 30–53 % všech případů) [1,9,10].

Patogeneze tohoto onemocnění je charakterizována „bludným kruhem“, v němž zánět bronchiální stěny (vyvolaný např. těžkou infekcí či aspirací) vede k jejímu poškození, následkem toho se zhorší mukociliární clearance dolních dýchacích cest, klesá očistná efektivita kašle a dále se progresivně rozvíjí chronický slizniční zánět (doprovázený zvýšenou produkcí hlenů, chronickou převážně bakteriální kolonizací dolních dýchacích cest). To vše pomalu a postupně přispívá k destrukci stěny průdušky s vývojem a následnou progresí non-CF BE (obr. 1) [1,9].

Klinické projevy

U některých pacientů jsou non-CF BE zcela náhodným nálezem při HRCT vyšetření hrudníku provedeném z jiného důvodu. Pokud jsou non-CF BE malého rozsahu a pacient je zcela **asymptomatický**, není jejich další došetřování zcela relevantní. Takové náhodně zjištěné případy non-CF BE někdy nacházíme u nemocných s CHOPN (jako součást tzv. překryvného syndromu některými autory nazývaném BCOS – bronchiectasis-COPD/chronic obstructive pulmonary disease). Další část odstavce se týká osob s přítomností symptomů. Nejčastějším klinickým projevem bronchiektázií je **kašel** (90 % všech symptomatických pacientů), který je převážně produktivní. Neproduktivní kašel se vyskytuje pouze u menší části (5–8 %) nemocných [1]. Dalším klinickým projevem je **dušnost** (70–80 % pacientů), která do určité míry koreluje s redukcí plicních funkcí (FEV₁) a s rozsahem postižení dle HRCT hrudníku. Přibližně u poloviny postižených jedinců je, minimálně

jednou za život, přítomná **hemoptýza**, která může být i prvním příznakem onemocnění. Ve většině případů je vznik hemoptýzy spojen s infekční epizodou (tzv. infekční exacerbací) BE. Hemodynamicky významná hemoptýza (více než 200–250 ml) se naštěstí vyskytuje zřídka (u asi 4 % pacientů s non-CF BE) [1]. K dalším projevům patří **bolesti na hrudi, únava a pomalý váhový úbytek**. Pokročilé, neléčené stadium onemocnění může vést k rozvoji respiračního selhání a k vývoji plicního srdce (tzv. cor pulmonale). **Akutní exacerbace non-CF BE** je definována jako náhlé zhoršení symptomů:

- nárůst objemu nebo
- purulentnost sputa
- zhoršení dušnosti
- zvýšení intenzity kašle
- progresi únavy
- pokles plicních funkcí při spirometrickém vyšetření nebo
- vznik nových symptomů: teploty, pleurální bolesti, objevení se hemoptýzy [1]

Diagnostika

Anamnéza

Na přítomnost non-CF BE bychom měli myslet u pacientů s **recidivujícími záněty dýchacích cest** (DC), nemocné s **dlouhodobou anamnézou produktivního kašle u nekuřáků** (určité respirační obtíže jsou nezdědka patrné již od dětství), dále u pacientů s **hemoptýzou** ne zcela jasné etiologie, či s kultivačním záchytem *Pseudomonas aeruginosa* ve sputu. Jak bylo uvedeno výše, onemocnění je stále v mnoha případech nepoznané. Pacienti jsou často vedeni jako chronická bronchitida či CHOPN (dle literárních údajů u pacientů s CHOPN najdeme na HRCT bronchiektázie až v 15–30 %) [1,9,27]. Non-CF BE bychom měli vyloučit i u pacientů s těžkým průběhem průduškového astmatu, u kterých onemocnění nemůžeme dostat pod kontrolu ani při maximální

Obr. 1. Patogeneze destrukce bronchiální stěny: morfologický rozdíl mezi zdravou průduškou (vlevo) a bronchiektatickou průduškou (vpravo). Původní ilustrace pro tento dokument od akademického malíře Josefa Bavora

Obr. 2. Predilekční místa výskytu BE u jednotlivých nemocí. Původní ilustrace pro tento dokument od akademického malíře Josefa Bavora

ABPA – alergická bronchopulmonální aspergilóza CF – cystická fibróza
NTM – netuberkulózní mykobakteriízy PCD – primární ciliární dyskineze TBC – tuberkulóza

inhalační terapii a adekvátní léčbě všech komplikujících faktorů.

Fyzikální vyšetření

Poslechový nález může být zcela normální, v mnoha případech jsou přítomny (trvale nebo intermitentně) in-spiračně-expirační pískoty, jindy přízvučné inspirační chrůpky/chropy z oblasti bronchiektázií, asi u třetiny pacientů můžeme zachytit čisté expirační vrzoty/pískoty imitující CHOPN nebo průduškové astma [1].

Zobrazovací vyšetření

Esenciálním základem moderní diagnostiky non-CF BE je HRCT hrudníku [1,9]. Na HRCT jsou non-CF BE definované jako průdušky s rozšířenou nebo ztlustělou stěnou, jejichž vnitřní průměr je větší než zevní průměr průdušku provázející arterie (tzv. příznak pečetního prstenu). Dále jsou to bronchy, které jsou na HRCT plic viditelné v pláš-

tové zóně plic (tedy blíže než 10 mm od pleury) a bronchy, u kterých nedochází k pravidelnému zužování po dvojím dichotomickém dělení (na HRCT patrné jako tzv. příznak kolejnice). U bronchiektázií je zpravidla přítomna rozšířená stěna průdušek. Bronchiektázie jsou často spojeny s přítomností tzv. mukoidních impakcí v bronších ev. s abnormalitami malých dýchacích cest. Mukoidní impakce (neboli bronchokély) v dilatovaných bronších jsou denzní struktury tvaru V či Y. Patologický hlenový obsah v malých bronších tvoří tzv. obraz morfé „tree-in-bud“ neboli obraz rašícího stromu jako obecný HRCT projev bronchiolitidy [20]. Podle tvaru lze BE rozdělovat na **cylindrické** (nejčastější), **varikózní** a **cystické** (vzácné, nejzávažnější), **obr. 2**. Na přítomnost BE nás může upozornit i skiagram hrudníku, na němž mohou být bronchiektá-

Obr. 3a. HRCT plic, transverzální řez, plicní okno: obraz non-CF bronchiektázií s patologickým obrazem a hladinkou. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

Obr. 3b. HRCT plic, koronární řez, plicní okno: HRCT nález non-CF bronchiektázií v plášťové zóně plic. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

Obr. 3c. HRCT plic, transverzální řez, plicní okno: HRCT nález non-CF cylindrických bronchiektázií. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

Obr. 3d. HRCT plic, transverzální řez, plicní okno: HRCT nález non-CF cystických bronchiektázií. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

zie patrné jako kolejnicová, cystická či hroznovitá projasnění; pokud jsou spojeny s patologickým obsahem, pak hovoříme o tzv. příznaku prstu rukavice (obr. 3) [21].

Plicní funkce

U každého pacienta s non-CF BE by měly být vyšetřeny plicní funkce minimálně pomocí spirometrie po provedení bronchodilatačního testu (podobně jako u nemocných s CHOPN). Plicní funkce méně postižených osob mohou být v normě, nebo (v závislosti od rozsahu postižení) je přítomná obstrukční ventilační porucha. U třetiny až čtvrtiny pacientů s non-CF BE nacházíme bronchiální hyperreaktivitu (tedy v řeči funkčního vyšetření pozitivní metacholinový, případně manitolový bronchokonstrikční test) [1,3–5,12].

Vyšetřovací panely

Základní vyšetřovací panel u všech nově diagnostikovaných se symptomatickými non-CF BE:

- imunoglobuliny IgG, IgA, IgM

- celkový IgE a specifické IgE/IgG proti *Aspergillus fumigatus*
- sputum na nespécifickou kultivaci a citlivost (zejména k záchytu *Haemophilus influenzae* a *Streptococcus pneumoniae* musí být sputum doručeno do laboratoře do 3 hod od odběru)
- sputum na specifickou (mykobakteriální) kultivaci a mikroskopii (na acidorezistentní tyčky)
- krevní obraz a diferenciální krevní rozpočet, základní biochemie včetně C-reaktivního proteinu
- revmatologický screening k vyloučení revmatoidní artritidy (RF latex, antiCCP), Sjögrenova syndromu (ANA screening, ENA screening, ENA SSA/B), vaskuli-

Obr. 3e a 3f. HRCT plic, koronární a transverzální řez, plicní okno: HRCT nález příznaku kolejnice. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

Obr. 3g. HRCT plic, transverzální řez, plicní okno: HRCT nález příznaku pečetiho prstenu. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

Obr. 3h. HRCT plic, transverzální řez, plicní okno: HRCT nález morfu „tree-in bud“. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

tidy (ANF, ANCA protilátky) – interpretace vždy nejlépe ve spolupráci s revmatologem

- **ORL vyšetření** (podezření na extraezofageální reflux, suspekce na poruchu ciliárního aparátu, podezření na dosud nediagnostikovanou cystickou fibrózu, obava ze syndromu žlutých nehtů, suspekce na respirační systém postihující vaskulitidy)
- **anamnestické, případně gastroenterologické** (pH-metrie či impedance jícnu) vyšetření při podezření na extraezofageální reflux s opakovanými aspiracemi
- **anamnestické pátrání** po infekcích v dětství (spalničky, černý kašel, virové pneumonie, tuberkulóza)
- **pečlivé zhodnocení HRCT nálezu** hrudníku (k vyloučení vrozených BE, někdy spojených s rozšířením trachey)

Rozšířený vyšetřovací panel provádíme ve specifických případech, pokud je přítomna klinická suspekce na následující onemocnění:

- **potní test** a případně **genetické vyšetření** k vyloučení **cystické fibrózy** (věk < 40 let nebo chronická kolonizace dýchacích cest *Staphylococcus aureus* či *Pseudomonas aeruginosa* v jakémkoliv věku, neprospívání a malnutrice, anamnéza steatorey, dominantní postižení horních plicních laloků, u mužů neplodnost)
- **sacharinový test** a **nazální měření oxidu dusnatého (NO)**, ev. **nativní vysokorychlostní mikroskopické vyšetření ciliárních buněk** respiračního traktu při suspekci na **primární ciliární dyskinezu** – PCD (záněty středouší, recidivující infekce horních cest dýchacích od dětského věku, neplodnost, dextrokardie, postižení dominantně středních laloků), při iniciální pozitivitě sacharinového testu (> 1 hod – pozor, není považováno za validní u nespolupracujících osob a u dětí) nebo při zvýšeném množství nazálního NO (< 100 ppb) je vhodné provést odběr řasinek z HDC či DCD k vyšetření nativní vysokorychlostní mikroskopii k verifikaci PCD (dostupné ve FN v Motole v Praze a ve

FN Hradec Králové), finální ověření přítomnosti PCD, odlišení od sekundárních poruch a podrobnější identifikace typu PCD (pomocí kultivace ciliárních buněk a jejich následné vysokorychlostní nativní mikroskopie, případně pomocí elektronové mikroskopie) je prováděno pro české dětské i dospělé pacienty v referenční laboratoři na Dětské klinice FN v Motole v Praze (prof. MUDr. P. Pohunek, CSc.)

- **flexibilní bronchoskopie:** při podezření na **aspiraci** (závažné formy extraezofageálního refluxu, neurologické onemocnění, trauma, abúzus) či na **plísňovou** nebo **mykobakteriální infekci** (postižení pravého středního laloku či linguly, BE většinou segmentární/lobární, v jejich okolí „tree-in-bud“, často náhodně roztroušené 1–2 cm noduly) zejména pokud je předchozí kultivace sputa negativní nebo pacient žádné sputum „neprodukuje“
- **vyšetření imunologem** při podezření na **imunodeficit** (primární – recidivující infekce dýchacích cest od dětství, menší vzrůst, postižení dolních laloků, či sekundární – při autoimunitních onemocněních, hematologických malignitách, po chemoterapii), dále **vyšetření imunitní odpovědi na vakcinaci** (schopnost tvorby specifických protilátek) proti tetanu, proti pneumokoku, případně *Haemophilus influenzae* (typ b)
- **hladina α_1 -antitrypsinu** – A_1AT při současné přítomnosti plicního emfyzému, často v mladším věku (zejména u kuřáků)

Mikrobiologie

U dvou třetin pacientů s non-CF BE nacházíme při kultivačním vyšetření sputa patogenní mikroorganismy. Nečastější je záchyt *Haemophilus influenzae* (asi 35 % pacientů), dále pak *Pseudomonas aeruginosa* (5–31 % pacientů), *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pneumoniae* a *Staphylococcus aureus* [3]. Méně často jsou zachyceny patogeny jako *Aspergillus* sp., koliformní gramnegativní organizmy, MRSA a atypická mykobakteria. Kolonizace dolních dýchacích cest (DDC) *Pseudomonas aeruginosa* je u pacientů s non-CF BE spojena s častějšími exacerbacemi, rychlejším poklesem plicních funkcí, horší kvalitou života a vyšší mortalitou. Pacienti bez kolonizace dýchacích cest *Pseudomonas aeruginosa* mají průměrnou deklinaci plicních funkcí asi 50 ml/rok, u pacientů s kolonizací dýchacích cest tímto patogenem je to výrazně více (> 120 ml/rok) [1,9,12].

Zhodnocení tíže a prognózy onemocnění

Stejně jako u mnoha jiných plicních chorob (CHOPN, průduškového astmatu a plicní fibrózy) jsou aktuálně i u pacientů s non-CF BE vypracované skórovací systémy k posouzení tíže a prognózy tohoto onemocnění. Dosud byly publikovány 2 typy těchto hodnotících škál: **Bronchiectasis Severity Index** (neboli BSI), **tab. 2** a **FACED score** (**tab. 3**) (zatím ani jeden nemá vytvořený oficiální český překlad) [4–6]. Zhodnocení rizika mortality/morbidity pomocí skórovacích systému BSI

Obr. 3ch. HRCT plic, koronární řez, plicní okno: HRCT nález varikózních non-CF bronchiektázií. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Evy Kočové

či FACED je doporučeno provádět co nejdříve od doby stanovení diagnózy (nejpozději do půl roku) a dále je nutné je kalkulovat ve stabilním stavu (bez exacerbace) [4–6,13].

Mortalita pacientů s non-CF BE nejčastěji souvisí s progresivním respiračním selháním a se závažnými nebo recidivujícími respiračními infekcemi [3]. Mezi rizikové faktory, které jsou spojeny s vyšší letalitou u pacientů s BE, patří kolonizace DC *Pseudomonas aeruginosa*, mužské pohlaví, větší tíže obstrukční ventilační poruchy a přítomnost poruchy plicní difuze (neboli transferfaktoru) [13].

Léčba

Cílem dlouhodobé léčby pacientů s non-CF BE je zlepšení klinických symptomů, snížení frekvence exacerbací, udržení plicních funkcí a zlepšení kvality života [1,9]. Terapie akutních stavů asociovaných s non-CF BE není předmětem tohoto sdělení. Nicméně pro úplnost je třeba ji velmi stručně zmínit. Při akutních exacerbacích jsou obecně doporučovány

- systémové kortikosteroidy v dávkách podobných jako u exacerbace CHOPN případně astmatu
- intenzifikovaná (4–6krát denně) bronchodilatační inhalální léčba
- akcentovaná fyzioterapie
- antibiotická léčba korigovaná ve spolupráci s lokální mikrobiologickou laboratoří dle aktuálního mikrobiologického statusu pacienta a závažnosti probíhající respirační infekce

U osob s výraznější nebo recidivující hemoptýzou je po stanovení krvácející strany metodou 1. volby provedení

léčebné embolizace bronchiální tepny postižené strany (neboli BAE – bronchial artery embolization) [28].

Tab. 3. FACED score: FEV₁, Age, Colonization *Pseudomonas aeruginosa*, Extent (rozsah postižení na CT), Dyspnea. Upraveno podle [5]

parametr	body
chronická kolonizace <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
ne	0
ano	1
dušnost dle mMRC skóre (0–4)	
0–2	0
3–4	1
FEV ₁ (% náležitých hodnot)	
≥ 50	0
< 50	2
věk (roky)	
< 70	0
≥ 70	2
počet postižených laloků (dle CT)	
1–2	0
> 2	1

vyhodnocení:

0–2 body = mírné postižení

3–4 body = středně těžké postižení

5–7 bodů = těžké postižení

Tab. 2. Bronchiectasis Severity Index (BSI). Upraveno podle [4]

Elektronická kalkulačka tohoto prognostického indexu je nyní volně dostupná na:
<http://www.bronchiectasisseverity.com>

parametr	0 bodů	1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů
věk (roky)	< 50	-	50–69	-	70–79	-	80
BMI (kg/m ²)	≥ 18,5	-	< 18,5	-	-	-	-
FEV ₁ (% náležitých hodnot)	> 80	50–80	30–49	< 30	-	-	-
hospitalizace (poslední 2 roky)	ne					ano	
počet exacerbací (poslední rok)	0–2	-	≥ 3	-	-	-	-
mMRC* (0–4)	0–2	-	3	4	-	-	-
kolonizace	nekolonizovaní	chronická kolonizace	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	-	-
radiologický rozsah	< 3 postižené laloky	≥ 3 postižené laloky nebo cystické BE	-	-	-	-	-

*upraveno – v originální tabulce je uvedena nemodifiková MRC škála (1–5)

vyhodnocení:

0–4 body = mírné postižení

5–8 bodů = středně těžké postižení

≥ 9 bodů = těžké postižení

Obr. 4. Dechové trenážéry s vibrací: Pari O-PEP, Flutter, RC-Cornet, Acapella. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Kateřiny Neumannové

Obr. 5. Dechové trenážéry bez vibrace: Threshold PEP, TheraPEP, PariPEP S-Systém. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Kateřiny Neumannové

Bronchiální hygiena

Zcela klíčovou komponentou terapie je adekvátní bronchiální očista (tzv. hygiena) dolních dýchacích cest. Je indikována u pacientů s produktivním kašlem nebo náletem hlenových zátek na HRCT plic. Správná očista vede k usnadnění expektorace, k prevenci vzniku dalších hlenových zátek a redukcí komplikací (pneumonií, atelektáz). Základem farmakologické léčby v oblasti bronchiální hygieny jsou mukoaktivní látky často zjednodušené nazývané jako **mukolytika**, které můžeme podávat jak perorálně, tak inhalační cestou (např. N-acetylcystein, ambroxol nebo erdosteín). V době akutní exacerbače je obecně doporučeno dávku mukolytik poněkud zvýšit. U pacientů s BE byl prokázán pozitivní efekt inhalace **hypertonického solného roztoku** (NaCl 3–14 %) na zlepšení plicních funkcí (FEV₁). K posouzení, zda tato léčba nezpůsobuje bronchospasmus, je vhodné provést spirometrické vyšetření před podáním a 5 min po aplikaci

Obr. 6. Dechové trenážéry pro zvýšení síly dýchacích svalů: Threshold PEP (výdechový trenážér) a Threshold IMT (nádechový trenážér). Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Kateřiny Neumannové

Obr. 7. Treshold (vlevo) a flutter (vpravo): způsob použití. Otištěno s laskavým svolením autorky snímků Kateřiny Neumannové, snímky vznikly se souhlasem nemocné

hypertonického solného roztoku. V případě přítomnosti bronchospazmu podáváme před inhalací hypertonického roztoku bronchodilatační nebulizaci (např. krátkodobě působící salbutamol). Inhalační léčba dornázou α neboli dezoxiribonukleázou (preparát Pulmozyme) není zatím u pacientů s non-CF BE indikovaná (není pro ni dosud dostatek důkazů na rozdíl od nemocných s BE podmíněnými cystickou fibrózou) [1,9].

K usnadnění expektorace hlenů se doporučuje pravidelné provádění **respirační fyzioterapie** (obr. 4–7), pro niž lze využít techniky aktivní drenáže s pomůckami nebo bez pomůcek. Mezi aktivní drenážní techniky patří **autogenní drenáž a aktivní cyklus dechových technik**.

Pro usnadnění posunu bronchiálního sekretu z periferních dýchacích cest směrem do centrálních používáme drenážní techniky, při kterých je výdech prováděn přes různé typy dechových trenažérů. Lze využít **dechové trenažéry s vibrací** – např. Pari O-PEP, Flutter, RC-Cornet, Acapellu anebo **dechové trenažéry bez vibrace** – např. Threshold PEP, TheraPEP, PariPeP S-Systém. Zejména u nemocných, u kterých jsou hleny husté a vazké, je vhodnější využít dechové trenažéry s vibrací. Vytvořené vibrace/oscilace se přenesou z dutiny ústní na bronchiální strom, a tím postupně uvolní hleny lpící na stěnách průdušek. Všechny dechové trenažéry kladou určitý odpor do výdechu a pomáhají tak předcházet výdechovému kolapsu dýchacích cest. Drenážní techniky jsou často kombinované s inhalační bronchodilatační (níže) a mukolytickou léčbou (níže). Znalost správného provádění technik respirační fyzioterapie vyžaduje opakovanou edukaci erudovaným respiračním fyzioterapeutem, který dokáže dle individuálních potřeb pacienta edukovat i o dalších technikách respirační fyzioterapie s cílem **podpory správného dechového vzoru** (např. dechová gymnastika, neurofyziologická facilitace dýchání, dýchání přes sešpulené rty, brániční dýchání), zvýšení **síly nádechových a výdechových svalů** (např. pomocí vytrvalostního a silového tréninku s dechovým trenažérem Threshold PEP a IMT). Nedílnou součástí **komplexní plicní rehabilitace** je také vytrvalostní a silový trénink. Drenážní techniky pro udržení čistoty dýchacích cest je doporučováno u osob s non-CF BE provádět každodenně (1–2krát denně), v případě klinických potíží i čas-

těji. Vytrvalostní a silový trénink je vhodné provádět alespoň 3krát týdně, aby byla dosažena a udržena dostatečná kondice nemocného [1,9,16–19].

Vakcinace

U pacientů se symptomatickými non-CF BE lze doporučit každoroční vakcinaci proti sezónní chřipce a jednorázovou vakcinaci proti pneumokokům [8].

Léčba antibiotiky

Léčba antibiotiky (ATB) má zásadní roli v managementu pacientů s non-CF BE. Jejím cílem je přerušení začarovaného kruhu „infekce – zánět – destrukce bronchiální stěny“. ATB užíváme k:

- léčbě akutních exacerbací
- eradikaci patogenů zhoršujících prognózu pacientů s non-CF BE a v neposlední řadě
- potlačení chronické infekce dýchacích cest pomocí dlouhodobě podávaných antibiotik

Léčba akutní exacerpace

Akutní exacerpace je definována jako zhoršení stávajících dechových potíží pacienta. Obvykle se jedná o změnu množství nebo charakteru hlenů (hleny jsou více vazké nebo purulentní, mají nitky krve nebo čerstvou krev), zhoršení dechu, kašle, přítomnost teplot či pleurálních bolestí. V těchto případech je doporučeno co nejdříve zahájit ATB léčbu v monoterapii. O výběru ATB se rozhodujeme na základě výsledku kultivace a citlivosti sputa vyšetřeného ve stabilním stavu. Vzhledem k charakteru nemoci je doporučeno ATB podávat minimálně po dobu 14 dnů (tab. 4). Před zahájením ATB léčby je doporučeno odeslat sputum na vyšetření aktuální kultivace. V případě selhání perorální ATB léčby, alterace celkového zdravotního stavu pacienta či při zachytu patogenu, který je rezistentní na perorálních ATB, je indikováno podání intravenózní ATB terapie dle citlivosti. Zatím nejsou k dispozici žádná data, která by doporučovala rutinní podávání antivirotik. Za úspěšně zvládnutou exacerbaci považujeme stav, při němž se pacient po dechové stránce dostane na svou dlouhodobou normu.

Tab. 4. Doporučená perorální ATB léčba – minimálně 14 dnů. Upraveno podle [1]

agens	léčba první linie	léčba druhé linie
neznámé agens	amoxicilin 3 × 1 g p.o.	klaritromycin 2 × 500 mg p.o. (alergie na peniciliny)
<i>Haemophilus influenzae</i>	amoxicilin 3 × 1 g p.o. nebo amoxicilin/klavulanát 3 × 625–1 000 mg p.o.	klaritromycin 2 × 500 mg p.o. nebo ciprofloxacin 2 × 500 mg p.o.
<i>Moraxella catarrhalis</i>	amoxicilin/klavulanát 3 × 625–1 000 mg p.o.	ciprofloxacin 2 × 500 mg p.o.
<i>Staphylococcus aureus</i> (typ MSSA)	amoxicilin/klavulanát 3 × 625–1 000 mg p.o.	doxycyklin 2 × 100 mg p.o.
<i>Staphylococcus aureus</i> (typ MRSA)	kotrimoxazol 2 × 960 mg p.o., ev. kombinace s rifampicinem 1 × 450–600 mg p.o.	doxycyklin 2 × 100 mg p.o. ev. kombinace s rifampicinem 1 × 450–600 mg p.o. třetí linie linezolid 2 × 600 mg p.o.
kolibacilární infekce (klebsiela, enterobacter)	amoxicilin/klavulanát 3 × 625–1 000 mg p.o.	ciprofloxacin 2 × 500 mg p.o.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ciprofloxacin 2 × 500–750 mg p.o.	

Eradikační léčba infekce *Pseudomonas aeruginosa*

Jak již bylo opakovaně zdůrazněno, chronická kolonizace *Pseudomonas aeruginosa* je u pacientů s non-CF BE asociovaná s častějšími exacerbacemi, rychlejším poklesem plicních funkcí, vyšší mortalitou a horší kvalitou života. Z těchto důvodů je doporučeno pokusit se o eradikaci prvozáhytu *Pseudomonas aeruginosa* v DC s cílem zabránit rozvoji chronické infekce (tab. 5).

Inhalační ATB k eradikaci nebo supresi infekce *Pseudomonas aeruginosa*

Výběr antibiotika k inhalační léčbě *Pseudomonas aeruginosa* se řídí výsledkem citlivosti na ATB.

Klinické studie prokázaly bezpečnost a efektivitu léčby inhalačním kolistinem, tobramycinem i gentamycinem [7,14,15]. Žádné z těchto ATB zatím nemá v ČR schválenou indikaci k léčbě pacientů s non-CF bronchiektáziemi. V praxi lze použít inhalační kolistin 2 MIU ve 4 ml aqua pro injectione 2krát denně, tato léčba podléhá schválení lokálního antibiotického střediska. K inhalační ATB léčbě je nutno používat kompresorové inhalátory. Před zahájením inhalační terapie ATB je vhodné posoudit, zda aplikace léku nevede k bronchospazmu, tj. provést spirometrii před podáním léku a pak 15 a 30 min po aplikaci inhalačního ATB. Při klinických projevech bronchospazmu či poklesu FEV₁ o > 15 % a > 200 ml je doporučeno před aplikací samotného inhalačního ATB podat salbutamol (v nebulizaci či ve formě dozovaného aerosolu). Následující den je vhodné zkontrolovat, zda bronchospasmus přetrvává i při aplikaci salbutamolu před podáním inhalačního ATB. Pokud je bronchospasmus přítomen i po přípravě bronchodilatačním lékem, je doporučeno vybrat alternativní ATB léčbu.

Dlouhodobá perorální ATB léčba

Cyklické střídání perorálních ATB dle výsledků předchozích kultur a citlivosti sputa (či bronchiálního výplachu) lze zvážit u pacientů, kteří mají časté (≥ 3 za 1 rok) nebo těžké (s pobytem v nemocnici) exacerbace [1,3]. Dlouhodobá terapie fluorochinolony se vzhledem k jejich nežádoucím účinkům a vzniku rezistence spíše nedoporučuje. Naopak dlouhodobá léčba perorálními makrolidy působí kromě antibakteriálního efektu také prostřednictvím jejich protizánětlivého a imunomodulačního efektu (popsána níže).

Protizánětlivá léčba

Jelikož podstatou bronchiektázií je zánět bronchiální stěny a infekce dýchacích cest, jeví se tedy jako přirozené, že součástí komplexní terapie bronchiektázií by měla být také protizánětlivá léčba, jejímž cílem by vedle ovlivnění zánětu (převážně neutrofilního) byla také modulace imunitní odpovědi bronchiální sliznice na chronickou infekci. Na druhé straně, protizánětlivé působení musí být při léčbě bronchiektázií natolik vyvážené, aby nevedlo ke vzniku či aktivaci bakteriálních a oportunních infekcí. V souvislosti s protizánětlivou léčbou u bronchiektázií probíhají klinické studie k využití statinů, biologické léčby či nesteroidních antirevmatik. V současnosti lze konstatovat, že pro dlouhodobé využití specifické protizánětlivé léčby zatím chybí dostatek informací (bude třeba čekat na výsledky dalších randomizovaných studií dlouhodobého charakteru) [1,9].

Kortikosteroidy mají sice dobrý protizánětlivý účinek u eozinofilního zánětu, avšak podstatně neovlivňují neutrofilní zánět, který je obvykle dominantně přítomen u non-CF BE. Dosud bylo provedeno několik studií, které sledovaly účinek **inhalačních kortikosteroidů** (IKS) u pacientů s bronchiektáziemi, navíc jen s malými počty zahrzených pacientů. Např. inhalační flutikazon podávaný v dávce 1 000 µg denně dospělým pacientům s bronchiektáziemi, sice vedl ke snížení množství sputa a zmírnění dušnosti, ale nedošlo ke zlepšení kašle, plicních funkcí ani ke snížení počtu exacerbací, naopak byl již po 4 týdnech terapie zjištěn nárůst množství bakterií ve sputu, včetně *Pseudomonas aeruginosa* [1]. V současné době není dostatek důkazů, které by prokázaly léčebný přínos inhalačních kortikosteroidů u pacientů s non-CF bronchiektáziemi ani průkazů jejich bezpečnosti (riziko vzniku pneumonií a jiných bakteriálních či mykotických infekcí v terénu chronického zánětu dýchacích cest a hyperprodukce hlenů) [22–24]. Léčbu inhalačními kortikosteroidy u pacientů s bronchiektáziemi tedy v současné době nelze doporučit. Výjimkou mohou být pacienti, kteří vedle bronchiektázií mají bronchiální astma; v takových případech je však nutno pečlivě sledovat výskyt případných infekčních komplikací, případně u osob s překryvem CHOPN a non-CF BE v případě, že je současně přítomná zjevná tendence k opakovaným exacerbacím eozinofilního typu. **Systémové kortikosteroidy** nejsou u pacientů s bronchiektáziemi pro dlouhodobé použití

Tab. 5. Schéma eradikace prvozáhytu *Pseudomonas aeruginosa*. Upraveno podle [1]

linie		léčba
1. linie		ciprofloxacin 2 × 500–750 mg p.o. 14 dnů
2. linie	postup 1	nadále ciprofloxacin 2 × 500–750 mg p.o. 3 týdny, současně kolistin 2 × 2 milionů jednotek (MIU) inhalačně 3 měsíce
	postup 2	monoterapie kolistinem 2 × 2 MIU inhalačně 3 měsíce
	postup 3	monoterapie antipseudomonádovým betalaktamem (ceftazidim 3 × 1 g, meropenem 4 × 1 g, piperacilin/tazobaktam 3 × 4,5 g) i.v. 14 dnů
	postup 4	kombinace antipseudomonádových betalaktamů (viz postup 3) s aminoglykosidem za kontrol sérových hladin (gentamicin 3–6 mg/kg v jedné denní dávce nebo amikacin 15 mg/kg/den v 1 nebo 2 denních dávkách) nebo s kolistinem (3 × 2 MIU; u tělesné hmotnosti < 60 kg 50 000–75 000 IU/kg rozdělené do 3 dávek) i.v. 14 dnů

indikováni, lze je použít pouze v případě terapie exacerbací nebo krátkodobé léčby ABPA (alergické bronchopulmonární aspergilózy) v terénu non-CF bronchiektázií [1].

Perorální makrolidy mají v léčbě non-CF svoje důležité místo. Perorálně podávaný azitromycin redukuje exacerbace a zlepšuje kvalitu života a mírně zlepšuje i plicní funkce (FEV₁). Perorálně podávaný erytromycin také redukuje výskyt exacerbací. Dlouhodobou protizánětlivou a imunomodulační léčbu makrolidy (celosvětově nejčastěji používán azitromycin po dobu 6–12 měsíců v dávce 250 mg nebo 500 mg 3krát týdně) lze zvážit u pacientů s častými exacerbacemi non-CF BE (≥ 3 za rok), dále s exacerbacemi a přetrvávající zhoršenou kvalitou života navzdory adekvátní léčbě a rovněž při chronické infekci *Pseudomonas aeruginosa*. Určitým rizikem této (z plicního pohledu efektivní) terapie je rozvoj rezistence na makrolidy, vznik hepatopatie, špatná gastrointestinální tolerance a popisován je i výskyt kardiiovaskulárních komplikací (arytmie při prodloužení QT intervalu) a poruchy sluchu. Nutné jsou rovněž kontroly respiračních sekretů na přítomnost netuberkulózních mykobakterií (základem jejich léčby jsou totiž makrolidy). Po uplynutí období 6–12 měsíců je vždy třeba individuálně rozhodnout o pokračování v léčbě s ohledem na přínosy, rizika a toleranci makrolidového léku [1,6,11].

Inhalační antibiotika pro dlouhodobé podávání u nemocných ve stabilní fázi non-CF BE (s cílem protizánětlivého působení) jsou ve středu zájmu současného výzkumu. Aktuální metaanalýza 26 studií (1 898 nemocných) ukázala, že studie s inhalačním tobramycinem a inhalačním ciprofloxacinem shodně prokazují potenciál redukovat množství bakterií *Pseudomonas aeruginosa* ve sputu, nicméně není schopna příznivě ovlivnit exacerbace, hospitalizace, plicní funkce ani kvalitu života [22–26]. Studie s inhalačně podávaným gentamycinem kromě redukce bakteriální nálože ve sputu zlepšuje kvalitu života a redukuje exacerbace, nicméně ani gentamycin nemá žádný přínos pro plicní funkce. Rovněž inhalovaný kolimycin kromě redukce bakteriální denzity snižuje výskyt exacerbací a kvalitu života. Inhalačně podávaný aztreonam nepřináší žádný pozitivní výsledek ve výše uvedených klinických parametrech. Navíc u inhalovaných antibiotik bylo potvrzeno výše uvedené riziko bronchospazmu zejména u tobramycinu a aztreonamu [11,14,15,22–26].

Antileukotrieny nejsou u pacientů s bronchiektáziemi indikovány [1].

Bronchodilatační léčba

Inhalační bronchodilatační terapie (formoterol, indakaterol, tiotropium a další dlouhodobě působící léky) je indikována u pacientů s přítomností bronchiální obstrukce (potvrzené funkčním vyšetřením), u kterých vede ke snížení kašle a k omezení pocitu dušnosti. V případě bronchospasmů (jako projevu bronchiální hyperreakivity) při léčbě inhalačními mukolytiky či ATB se doporučuje preventivní podání krátkodobě působícího

salbutamolu před inhalacemi výše uvedených farmak. Perorální retardované teofyliny lze u pacientů s BE použít jako doplněk k inhalační bronchodilatační léčbě (viz výše), nejsou ale doporučovány k paušálnímu užívání [1,9].

Léčba základní příčiny vyvolávající non-CF BE

V případě zjištění kurabilního základního onemocnění, které podmiňuje vznik non-CF BE, je v rámci snahy o zabránění progresu tohoto onemocnění nutná mezioborová spolupráce: imunolog, revmatolog, gastroenterolog, centrum pro deficit A₁AT (Thomayerova nemocnice Praha), CF centra (FN Motol Praha, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc a FN Plzeň).

Chirurgická léčba

Chirurgické metody vyhraujeme pro případy přísně lokalizovaného postižení (např. pozánětlivé non-CF BE postihující pouze jeden plicní lalok nebo jeho část), u nichž selhává farmakologická léčba a pacient má perzistující klinické potíže, které negativně ovlivňují kvalitu jeho života (recidivující respirační infekce s obtěžující chronickou produkcí purulentního sputa, opakovaná hemoptýza pocházející z non-CF BE, perzistující plicní absces v okolí non-CF BE, výrazný zápach z úst podmíněný non-CF BE). Nejlepší výsledky resekce mají pacienti s jednostranným segmentálním postižením, u kterých je možná kompletní resekce postiženého plicního laloku [1]. Neanatomické resekce by neměly být prováděny, protože někdy vedou k nekompletnímu odstranění postižené části plic. Chirurgická resekce z indikace non-CF BE se obvykle provádí z laterální torakotomie, při rozsáhlejší resekci z posterolaterální torakotomie. Videotorakoskopie (VATS) se v současné době používá pouze u menší části resekci. Vzácnou indikací k chirurgické resekci může být i masivní hemoptýza nezládnutelná předchozí léčebnou embolizací bronchiální tepny (neboli BAE), či recidivující hemoptýza, která je v kauzální souvislosti s lokalizovaným postižením plicí při non-CF BE.

Léčba v terminálních fázích onemocnění

V případě chronické hypoxemické respirační insuficience zajišťujeme **dlouhodobou domácí oxygenoterapii** (neboli DDOT) pomocí stacionárních či přenosných koncentrátorů kyslíku. Chronické respirační selhání s hyperkapnií je pak indikací k **domácí neinvazivní ventilační podpoře** (neboli NIPV) aplikované často spolu s výše uvedenou DDOT. Oba léčebné postupy (DDOT a NIPV) sice nesnižují mortalitu non-CF BE pacientů, ale byl prokázán jejich příznivý efekt na zlepšení kvality života a na redukci počtu akutních hospitalizací. Mladší pacienti (< 65 let) s těžce omezenými plicními funkcemi (FEV₁ pod 30 % normy nebo s rychlým poklesem FEV₁) a s dalšími projevy (častými exacerbacemi vyžadujícími ATB léčbu, případně s neustupujícím pneumotoraxem nebo s hemoptýzou nezládnutelné embolizací bronchiálních tepen) je teoreticky možné konzultovat v transplantačním centru FN v Motole v Praze k posouzení indikace k plicní transplantaci (non-CF BE však před-

stavují spíše marginální indikaci v oblasti transplantace plic).

Lázeňská terapie

Pacienti s BE mají nárok na komplexní lázeňskou péči dle kategorie V/4 (nejčastěji v Luhačovicích, v Karlově Studánce nebo Jeseníku). Efekt lázeňské terapie je zejména v možnosti dlouhodobé a efektivní edukace inhalační techniky a všech způsobů optimální hygieny DDC.

Dispenzarizace pneumologem

Pacienti postižení non-CF BE v souvislosti s primárním imunodeficitem, primární ciliární dyskinezou (PCD), revmatoidní artritidou (RA), alergickou bronchopulmonální aspergilózou (ABPA), a všichni nemocní s rychlým poklesem (deklínací) plicních funkcí nebo ti s četnými infekčními exacerbacemi, by měli mít 4krát v roce vyšetřeny plicní funkce a 2–4krát v roce mikrobiologické vyšetření sputa. U ostatních se četnost kontrol řídí individuálně jejich klinickým stavem: u většiny lehčích forem onemocnění postačuje vyšetření plicních funkcí a kultivace sputa jednou za 6 či spíše 12 měsíců.

Závěr

Bronchiektázie nemocných bez přítomnosti cystické fibrózy (tzv. non-CF BE) nejsou ani v rozvinutých zemích Evropy žádnou vzácností. Jejich symptomy se částečně překrývají s projevy dalších respiračních onemocnění, a proto mohou v reálném životě často uniknout pozornosti lékařů i nemocných. Základní diagnostickou metodou je v současnosti výpočetní tomografie s vysokým rozlišením. Terapie non-CF BE zahrnuje zejména intervence směřující k řešení kauzální příčiny non-CF BE a pečlivou toaletu dolních dýchacích cest spolu s podáváním mukoaktivních (mukolytických) farmak. Pausální přínos vakcinace je obdobný jako u pacientů s CHOPN. Protizánětlivá medikace nemá zcela jasnou oporu v klinických studiích. Nejpravděpodobnější se v této oblasti jeví přínos perorálně podávaného azitromycinu. Někteří nemocní mohou profitovat z chirurgické léčby. Komplikace spojené se závažnou hemoptýzou můžeme řešit angiograficky. Rovněž dlouhodobá domácí oxygenoterapie, domácí neinvazivní ventilační podpora a případná transplantace plic u osob bez absolutních kontraindikací jsou dalšími modalitami dostupnými pro každého pacienta sledovaného s non-CF BE v České republice.

Literatura

1. Pasteur MC, Bilton D, Hill AT. British Thoracic Society guideline for non-CF bronchiectasis. *Thorax* 2010; 65(7): 577. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1136/thx.2010.142778>>.
2. Weycker D, Edelsberg J, Oster G et al. Prevalence and economic burden of bronchiectasis. *Clin Pulm Med* 2005; 12(4): 205–209.
3. EMBARC – The European Bronchiectasis Registry. Dostupné z WWW: <<https://www.bronchiectasis.eu/>>.
4. Chalmers JD, Goeminne P, Aliberti S et al. The Bronchiectasis Severity Index An International Derivation and validation Study. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 189(5): 576–585. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201309-1575OC>>.

5. Martinez-Garcia MA, de Gracia J, Vendrell Relat M et al. Multidimensional approach to non-cystic fibrosis bronchiectasis: the FACED score. *Eur Respir J* 2014; 43(5): 1357–1367. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00026313>>.
6. Saleh AD, Hurst JR. How to assess the severity of bronchiectasis. *Eur Respir J* 2014; 43(5): 1217–1219. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00226913>>.
7. Haworth CS, Foweraker JE, Wilkinson P et al. Inhaled Colistin in Patients with Bronchiectasis and Chronic Pseudomonas aeruginosa Infection. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 189(8): 975–982. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201312-2208OC>>.
8. Doporučení české vakcinologické společnosti pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti [online] aktualizováno 16.dubna 2013. Dostupné z WWW: <<http://www.linkos.cz/aktualne-odbornikum/doporuzeni-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-pro-pneumokokovou-vakcinaci-v-dospelosti/>>.
9. Floto RA, Haworth CS. Bronchiectasis. *European Respiratory Monograph*; 52. European Respiratory Society Journals: 2010. ISBN 978-1849840118.
10. Alteburg J, Wortel K, de Graaff CS et al. Validation of visual analogue score (LRTI-VAS) in non-CF bronchiectasis. *Clin Respir J* 2016; 10(2): 168–175. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1111/crj.12198>>.
11. Zemánková J, Stříž I. Imunomodulační účinky makrolidových antibiotik. *Alergie* 2012; 14(4): 271–281.
12. Martinez-Garcia MA, Soler-Cataluna JJ, Perpina-Tordera M et al. Factors associated with lung function decline in adult patients with stable non-cystic fibrosis bronchiectasis. *Chest* 2007; 132(5): 1565–1572.
13. Loebinger MR, Wells AU, Hansell DM et al. Mortality in bronchiectasis: a long-term study assessing the factors influencing survival. *Eur Respir J* 2009; 34(4): 843–849. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00003709>>.
14. Murray MP, Govan JRW, Docherty CJ et al. A randomised controlled trial of nebulised gentamicin in non-cystic fibrosis bronchiectasis. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 183(4): 491–499. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201005-0756OC>>.
15. Barker AF, Couch L, Fiel SB et al. Tobramycin solution for inhalation reduces sputum Pseudomonas aeruginosa density in bronchiectasis. *Am J Respir Crit Care Med* 2000; 162(2 Pt 1): 481–485.
16. Spruit, MA, Singh SJ, Garvey C et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. *Am J Respir Crit Care Med* 2013; 188(8): e13–e64. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201309-1634ST>>. Erratum in *Am J Respir Crit Care Med*. 2014; 189(12): 1570.
17. Bolton CE, Blakey JD, Morgan MD. British Thoracic Society guidelines on pulmonary rehabilitation in adults: your opinion is noted. *Thorax* 2014; 69(4): 388–389. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2013-204754>>.
18. Smolíková L, Máček M. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů: Brno 2010. ISBN 978-80-7013-527-3.
19. Neumannová K, Zatloukal J, Koblížek V et al. Doporučený postup pro plicní rehabilitaci. 2014. Dostupné z WWW: <<http://www.pneumologie.cz/guidelines/>>.
20. Kim SJ, Im JG, Kim IO et al. Normal bronchial and pulmonary arterial diameters measured by thin section CT. *J Comput Assist Tomogr* 1995; 19(3): 365–369.
21. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H et al. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. *Radiology* 2008; 246(3): 697–722. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2462070712>>.
22. Tsang KW, Tan KC, Ho PL et al. Inhaled fluticasone in bronchiectasis: a 12 month study. *Thorax* 2005; 60(3): 239–243.
23. Martinez-Garcia MA, Perpina-Tordera M, Roman-Sanchez P et al. Inhaled steroids improve quality of life in patients with steady-state bronchiectasis. *Respir Med* 2006; 100(9): 1623–1632.
24. Kapur N, Bell S, Kolbe J et al. Inhaled steroids for bronchiectasis. *Cochrane Database Syst Rev* 2009; (1): CD000996. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD000996.pub2>>.

25. Henkle E, Aksamit TR, Barker AF et al. Pharmacotherapy for Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis: Results From an NTM Info & Research Patient Survey and the Bronchiectasis and NTM Research Registry. *Chest*. 2017; pii: S0012-3692(17)30810-3. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2017.04.167>>.
26. Fjaellegaard K, Sin MD, Browatzki A et al. Antibiotic therapy for stable non-CF bronchiectasis in adults – A systematic review. *Chron Respir Dis* 2017; 14(2): 174–186. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1177/1479972316661923>>.
27. Hurst JR, Elborn JS, De Soyza A. [BRONCH-UK Consortium]. COPD – bronchiectasis overlap syndrome. *Eur Respir J* 2015; 45(2): 310–313. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00170014>>.
28. Panda A, Bhalla AS, Goyal A. Bronchial artery embolization in hemoptysis: a systematic review. *Diagn Interv Radiol* 2017; 23(4): 307–317. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.5152/dir.2017.16454>>.

MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

✉ vladimir.koblizek@fnhk.cz

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce 17. 9. 2017

Přijato po recenzi 26. 9. 2017