Aplastická anémie

Jaroslav Čermák^{1,2}

¹Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK, Praha

²Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn

Aplastická anémie – dřevový útlum (AA) je definována jako pancytopenie s hypocelulární kostní dřeví bez přítomnosti fibrózy či infiltrace abnormálními buňkami. V současné době se předpokládá, že převážná většina útlumů krvetvorby je způsobena imunitními mechanizmy. Noxa působící na kmenovou krvetvornou buňku indukuje tvorbu neoantigenu či odhalení kryptického antigenu na jejím povrchu, což vede k aktivaci imunitních efektorových buněk s následnou apoptózou kmenových buněk. Pro diagnózu AA je rozhodující histologický nálezn v biopsickém vzorku kostní dřevě, v diferenciální diagnóze je třeba odlišit zejména hypoplastickou formu myelodysplastického syndromu (MDS), paroxysmální noční hemoglobinurii (PNH), leukemii z vlasatých lymfocytů či pozdní manifestaci některé z kongenitálních cytopenií. U těžké formy AA (severe aplastic anemia – SAA) se uplatňuje v 1. linii léčby transplantace krvetvorných buněk od HLA shodného příbuzného dárce či kombinovaná imunosuprese. Transplantace od nepříbuzného dárce může být metodou volby v 2. linii při selhání imunosuprese. Recentní studie prokazují jako efektivní léčebnou metodu podávání eltrombopagu či jeho kombinaci s imunosupresí. Až u 15 % nemocných s AA může v pozdější době dojít k rozvoji PNH, MDS či akutní leukemie. Význam přítomného defektu imunity a imunosupresivní léčby pro rozvoj klonální proliferace je stále diskutován.

Klíčová slova: aplastická anémie – diagnostika – eltrombopag – imunosuprese – léčba – transplantace

Aplastic anemia

Summary

Aplastic anemia – bone marrow failure (AA) is defined as pancytopenia with hypocellular bone marrow without signs of marrow fibrosis or of presence of abnormal cells. Recent studies showed that most of AA cases might be mediated by immune mechanisms. Toxic agent leads to expression of neoantigens or cryptic antigens on the surface of pluripotent hematopoietic stem cells with subsequent activation of immune effector cells and induction of stem cell apoptosis. Histopathological findings obtained from bone marrow biopsy are crucial for diagnosis of AA. Hypoplastic MDS, PNH, hairy cell leukemia and late manifestation of congenital cytopenias must be excluded in differential diagnosis. Allogeneic stem cell transplantation from HLA matched related donor or combined immune suppression represent the first line treatment for patients with severe AA (SAA). Transplantation from unrelated donor may be a second line treatment for patients who failed to respond to immunosuppressive therapy. Recent studies showed eltrombopag or its combination with immune suppression as an effective therapeutic approach to AA patients. Up to 15 % of AA patients may later develop PNH, MDS or acute leukemia. An influence of disturbed immune mechanisms as well as of immunosuppressive treatment on the development of clonal proliferation is currently discussed.

Key words: aplastic anemia – diagnosis – eltrombopag – immunosuppression – transplantation – treatment

Úvod

Aplastická anémie – dřevový útlum je definována jako pancytopenie s hypocelulární kostní dřeví bez přítomnosti fibrózy či infiltrace abnormálními buňkami. Pro diagnózu aplastické anémie (AA) je nutná přítomnost alespoň 2 kritérií charakterizujících cytopenii v periferní krvi – Hb < 100 g/l, počet neutrofilů (NS) < $1,5 \times 10^9/l$, počet trombocytů (PLT) < $50 \times 10^9/l$ [1]. Těžká aplastická anémie (severe aplastic anemia – SAA) je charakterizována sní-

žením buněčnosti kostní dřevě pod 25 % spolu se splněním nejméně 2 kritérií v periferní krvi: počet retikulyocytů (RTC) < $20 \times 10^9/l$, NS < $0,5 \times 10^9/l$, PLT < $20 \times 10^9/l$, o velmi těžké aplastické anémii mluvíme u SAA s počtem NS < $0,2 \times 10^9/l$ [2].

Etiologie a patogeneze

Byla popsána celá řada etiologických činitelů, jež mohou útlum krvetvorby vyvolat. Mezi infekční agens patří ze-

jména viry hepatitidy A, B a C, méně často virus Epstein-Barr (EBV), cytomegalovirus (CMV) či infekce virem parvoviru B19 nebo virus lidské imunodeficiency (human immunodeficiency virus – HIV). Rovněž miliární tuberkulóza se může prezentovat poměrně těžkým stupněm AA, autoimunní onemocnění jsou většinou doprovázena lehčím stupněm cytopenie. Rozvoj pancytopenie je průvodním nálezem léčby cytostatiky, u řady dalších léků je rozvoj útlumu krvetvorby po jejich podání zřejmě důsledkem idiosynkrazie – přecitlivělosti na danou látku. Mechanismus tohoto procesu není zcela jednoznačně objasněn, mohou se uplatňovat určité genetické varianty v detoxifikačních mechanismech či vystupňovaná imunitní odpověď na expresi některých neoantigenů na povrchu dané látky [3]. Rovněž některé chemické látky (benzen) byly popsány jako etiologický činitel u AA. Nicméně, u více než 70 % nemocných s AA se nepodaří objasnit příčinu vzniku útlumu krvetvorby a mluvíme o idiopatickém útlumu krvetvorby.

V minulosti byla popsána řada mechanismů, kterými může dojít ke vzniku AA (přímé poškození kmenové krvetvorné buňky, poškození hemopoetického stromatu, poškození genomu inkorporací viru). V současné době se

předpokládá, že převážná většina útlumů krvetvorby je způsobena **imunitními mechanismy**. Noxa působící na kmenovou krvetvornou buňku indukuje tvorbu neoantigenů či odhalení kryptického antigenu na jejím povrchu. Antigen prezentující buňky předávají tento antigen T-lymfocytům, což vyvolává jejich aktivaci a proliferaci (obr. 1), jež je spojena se sekrecí cytokinů. Zvýšená produkce interleukinu 2 (IL2) vede k polyklonální expanzi T-lymfocytů. Zvýšená sekrece interferonu γ (IFN γ) a tumor necrosis faktoru α (TNF α) je spojena s aktivací Fas receptoru (FasR) na povrchu kmenových buněk a s následnou indukci apoptózy cílových CD34 buněk vazbou Fas ligand (FasL) na FasR. IFN γ krom toho inhibuje buněčný cyklus a indukuje tvorbu toxických produktů (např. NO) [3]. Krom toho je diskutován možný význam poruchy hemopoetického prostředí na alteraci reparačních mechanismů či možný inhibiční vliv přítomných tukových buněk na hematopoézu. V posledních letech je věnována velká pozornost úloze telomer a poruše jejich reparece v rozvoji AA [4]. Telomery jsou lokalizovány na koncích chromosomů a chrání je před poškozením DNA restrikčními enzymy. Fyziologické zkrácení telomer pozorované při každém buněčném cyklu je korigováno reparačním komplexem – telomerázou, jenž

Obr. 1. Schéma vzniku AA na podkladě autoimunitních mechanismů. Upraveno podle [3].

Neoantigen exprimovaný poškozenou kmenovou krvetvornou buňkou (Ag) je předán antigen prezentující buňkou receptorům T-lymfocytů (TCR) a za účasti kostimulačních molekul (SLAM) je stimulována exprese IFN γ a TNF α . Zvýšená sekrece IL2 vede k polyklonální expanzi T-lymfocytů, produkovaný IFN γ a TNF α vyvolávají v poškozené kmenové krvetvorné buňce řadu reakcí vedoucích k tvorbě toxických produktů (NO), zástavě buněčného cyklu a útlumu proteosyntézy. Dochází k aktivaci Fas receptoru (FasR), jenž se váže s Fas ligand (FasL) a tento proces aktivuje apoptózu. Výsledkem je zánik kmenové krvetvorné buňky a rozvoj selhání kostní dřeně.

sestává z TERT enzymu – reverzní transkriptázy, jejího RNA templátu TERC a stabilizujících proteinů (zejména DKC1). Postupné zkracování telomer je fyziologickým mechanismem napomáhajícím odstraňování „přestárých buněk“ z organismu. **Mutace TERT a TERC genů** vedou ke kritickému zkrácení telomer a k předčasnému zániku buněk při současně snížené odpovědi na poškození DNA. Vrozené mutace TERT a TERC genů vedou k obrazu dyskeratosis congenita. Snížená telomerázová aktivita v důsledku mutace TERT či TERC je dnes pokládána za rizikový faktor u AA přispívající k hypocelularitě dřene. Na druhé straně, pokud je zachována odpověď na DNA poškození, proliferace buněk s velmi krátkými telomerami vede k nestabilitě genomu, akvizici dalších mutací a možné maligní transformaci [5].

Před 50 lety byla publikována první studie zabývající se rozvojem **klonální proliferace u nemocných s AA** [6]. U nemocných s AA léčených dlouhodobě imunosupresí byl během 10 let popsán u 10 % nemocných rozvoj myelodysplastického syndromu (MDS) a u 7 % přechod do akutní myeloidní leukemie (AML) [3]. Krom toho vzniká u více než 50 % nemocných s AA klon CD59 a CD55 deficitních buněk typický pro paroxysmální noční hemoglobinurii (PNH) [7,8]. Současná teorie předpokládá, že určité mutace, které vedou buď k nižší imunogenicitě některých progenitorových buněk, či k rezistenci na apoptózu zprostředkovanou cytotoxickými T-lymfocyty, mohou být

příčinou imunitního úniku a selekce mutovaných progenitorů s následnou proliferační výhodou (obr. 2) [9]. Je stále diskutováno, do jaké míry může podávaná imunosupresivní léčba podporovat klonální proliferaci. U nemocných s AA byla popsána řada chromosomálních aberací [9], jejich prognostický význam se zdá být obdobný jako u nemocných s myeloidními malignitami. Změny na 7. chromosomu [-7/del(7q)] byly spojeny s nepříznivou prognózou, trisomie 8. chromosomu a delecí 13q a přítomnost malého PNH klonu byly spojeny s lepší odpovědí na imunosupresi a dobrou prognózou [10]. Metody molekulární cytogenetiky a celogenomové sekvenování prokázaly jako nejčastěji mutované geny *PIG-A*, *BCOR* a *BCOR-L1*, tyto mutace byly spojeny s příznivou prognózou na rozdíl od mutací genů *DNMT3A*, *RUNX1*, *ASXL1*, *CSMD1* či *TP53*, jež vedly k vyššímu riziku rozvoje klonální proliferace [11,12]. Recentní studie ukazují, že nepříznivý efekt některých mutací může být v souvislosti s poměrně rychlým nárůstem procenta mutované alely (tzv. VAF – frekvencí variantní alely) [13].

Diagnostika a diferenciální diagnostika

V tab. jsou shrnuty základní diagnostické a diferenciálně diagnostické metody u AA, jež jsou uvedeny v současných léčebných doporučeních [14]. Při vyšetření parametrů **krvního obrazu** by měla být splněna kritéria uvedená v úvodu článku. Vyšetření **počtu retikulocytů** je důle-

Obr. 2. Vývoj klonální proliferace ze selhání kostní dřeně. Mutace, jež mohou postihovat kmenové krvetvorné buňky (HSC) a které se za normálních okolností vůbec nemusejí projevit, mohou při rozvoji AA na podkladě apoptózy způsobené cytotoxickými T-lymfocyty (CTL) uniknout z imunitního dohledu, pokud jsou méně imunogenní než normální buňky či rezistentní na CTL vyvolanou apoptózu. Tyto buňky takto získávají selektivní klonální proliferační výhodu, což vede k postupné expanzi mutovaného klonu. Je otázkou, do jaké míry může být tento proces podpořen imunosupresivní léčbou podanou při selhání kostní dřeně. Upraveno podle [9]

žité k posouzení funkční kapacity kostní dřeně, k vyloučení inefektivní erytropoézy a hemolytické komponenty. **Morfologický náález** v periferní krvi může podpořit odlišení od MDS a myelofibrózy a vyloučit přítomnost vlasatých lymfocytů. Monocytopenie může být známkou MonoMac syndromu při vrozené mutaci *GATA2* genu. Vyšetření **aspirátu kostní dřeně** vykazuje hypocelularitu a může pomoci vyloučit dysplastické změny, pro diagnostiku AA je však zásadní histologické vyšetření **biopstického vzorku** kostní dřeně, jež slouží k přesnému posouzení buněčnosti dřeně, vyloučení infiltrace dřeně hematologickým či jiným nádorem, k průkazu možné dysplazie a přítomnosti fibrózy dřeně. Přítomnost chromosomálních změn (zejména typických pro MDS) při **cytogenetickém vyšetření** kostní dřeně může podpořit diagnózu klonální proliferace, nicméně asi u 12 % nemocných s AA mohou být změny karyotypu transienční a vymizet během dalšího průběhu choroby [15]. Metody molekulární genetiky a cytogenetiky (NGS – sekvenování nové generace a SNP – vyšetření polymorfismu jednotlivých nukleotidů) zatím nejsou součástí rutinního vyšetření u AA. Vyšetření periferní krve pomocí **průtokové cytometrie** je pro diagnostiku PNH zásadní. K vyloučení pozdní manifestace kongenitálních cytopenií slouží vyšetření **hladiny HbF**, jež je u těchto chorob zvýšena, u všech nemocných mladších 50 let s AA by mělo být provedeno vyšetření periferní krve na incidenci spontánních a indukovaných **chromosomálních zlomů** k vyloučení tzv. němých forem Fanconiho anémie.

Sérologické vyšetření na přítomnost hepatitidy A, B, C, EBV, CMV, HIV infekce či infekce parvovirem B19 může odhalit etiologické činitele AA, vyšetření ANF či protilátek proti dvouvláknové DNA pak spojitost se systémovým onemocněním. Zvětšení jater či sleziny při **USG**

vyšetření může podpořit diagnózu myelofibrózy či dřeňové lymfoproliferace (zejména leukemie z vlasatých lymfocytů).

V rámci diferenciální diagnostiky je třeba v první řadě odlišit AA od **hypoplastické formy MDS**. Rozlišení bývá často velmi obtížné a mnohdy až opakované vyšetření kostní dřeně v průběhu několika měsíců ukáže, zda se choroba vyvíjí směrem k závažnému selhání kostní dřeně či zda dochází k rozvoji klonální proliferace. Diagnózu MDS podporuje náález morfologických dysplastických změn v kostní dřeni, přítomnost blastů v periferní krvi a zvýšený počet CD34⁺ buněk ve dřeni spolu s ložisky reziduální hemopoézy, abnormální lokalizací nezralých prekurzorů krvetvorby (tzv. ALIP) a přítomností retikulínu. Význam cytogenetického vyšetření již byl zmíněn výše. Pro přítomnost **PNH klonu** svědčí náález CD55 a CD59 deficitních erytrocytů, granulocytů či monocytů v periferní krvi při užití vysoce senzitivních metod průtokové cytometrie (FLAER). Pro nemocné s primární **myelofibrózou** je typická přítomnost fibrózy ve dřeni, náález mladších forem granulocytů a normoblastů v diferenciálu periferní krve, poikilocytóza a slzičkovitý tvar erytrocytů. Důležitým diferenciálně diagnostickým nálezem u myelofibrózy je přítomnost zvětšené sleziny. Přítomnost splenomegalie je důležitým diagnostickým parametrem i u dřeňových forem maligních lymfomů, zejména pro tzv. **leukemii z vlasatých lymfocytů** je typický náález pancytopenie s hypocelulární kostní dřeni se známkami fibrózy a s ložisky lymfocytů s typickou morfologií a expresí povrchových antigenů CD19, CD20, CD22, CD11c, CD25, CD103 a FMC7, současně je přítomna splenomegalie či hepatosplenomegalie. Vzácně může být doprovázena těžkou pancytopenií miliární **tuberkulózy**. Jak již bylo zmíněno výše, u mladších nemocných (zejména mezi 20. a 30. rokem věku) je třeba vždy vyloučit pozdní manifestaci některé z **kongenitálních cytopenií**. Jedná se zejména o vyloučení Fanconiho anémie vyšetřením spontánních a indukovaných chromosomálních zlomů a ev. mutací *FA* genu, pancytopenie s těžkou monocytopenií může být známkou tzv. MonoMac syndromu při mutaci *GATA2* genu.

Tab. Nejdůležitější vyšetření užívaná v diagnostice a diferenciální diagnostice aplastické anémie

kostní dřeň	sternální punkce: morfologické, cytogenetické, cytochemické vyšetření
	trepanobiopstické vyšetření: histologické vyšetření s barvením na retikulín
periferní krev	krvní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
	biochemické parametry (jaterní testy, hormony štítné žlázy)
	vyšetření počtu CD55 a CD59 deficitních buněk pomocí průtokové cytometrie
	elfo hemoglobinu (zvýšená hladina HbF u kongenitálních cytopenií)
	vyšetření spontánních a indukovaných chromosomálních zlomů
	virologické vyšetření (virové hepatitidy, parvovirus B19, HIV, EBV)
zobrazovací metody	vyšetření testů na systémová onemocnění (ANF, anti-dsDNA)
	USG břicha
	CT mediastina a břicha

Léčba

Léčebný přístup k nemocným s AA závisí na řadě faktorů: stupni cytopenie, věku nemocného, komorbiditách a přítomnosti vhodného dárce krvetvorných buněk. Základní terapeutickou rozvahou u SAA je rozhodnutí mezi indikací alogenní transplantace krvetvorných buněk (stem cell transplantation – SCT) a imunosupresivní léčbou. Transplantace krvetvorných buněk je podle současných doporučení [14,16] indikována jako metoda první volby u nemocných mladších 40 či 50 let, pokud je přítomen **HLA shodný příbuzný dárc**, přičemž nejlepší výsledky jsou dosahovány u nemocných mladších 20 let, z nichž 10 let přežívá více než 80 % nemocných, ve skupině mezi 20.–40. rokem věku přežívá 10 let 70–75 % nemocných, u nemocných starších 40 let pak 55 % nemocných [17,18]. Rozdíly jsou dány zejména zvyšující se incidencí

selhání štěpu a reakci štěpu proti hostiteli (GVHD) u starších nemocných. Výsledky Evropské transplantační skupiny (European Group for Blood and Marrow Transplantation – EBMT) prokázaly výhodu použití kmenových krvetvorných buněk z periferní krve [19], v předtransplantační přípravě se podávají kombinace imunosupresivních látek (antitymocytární globulin – ATG, cyklofosfamid, fludarabin, alemtuzumab). Transplantace od **HLA shodného nepříbuzného dárce** má nejlepší výsledky u dětí do 10 let, u nemocných do 30 let věku přežívá 10 let asi 75 % nemocných, ve skupině nad 40 let přežívá 10 let méně než 50 % nemocných [16], lepších výsledků bylo dosaženo se štěpem kostní dřeně, přípravné režimy kombinují imunosupresi s nízkými dávkami celotělového ozáření [20]. Nicméně, současná léčebná doporučení indikují SCT od nepříbuzného dárce jako metodu první volby stále jen jako experimentální u nemocných mladších 30–40 let věku, metodou volby je ve 2. linii při neúspěchu kombinované imunosuprese u nemocných mladších 50–60 let [14,16]. Haploidentická SCT je zatím u AA rovněž experimentálním přístupem. Rejekce štěpu je pozorována u 5–15 % nemocných s SAA, pozdním nepříznivým následkem SCT může být rozvoj EB virové lymfoproliferace.

Kombinovaná imunosupresivní léčba zahrnuje podávání antitymocytárního globulinu (ATG) v dávce 40 mg/kg/den 4 dny spolu s krátkodobou imunosupresí prednisonem (1 mg/kg/den 14 dní) a následným dlouhodobým

podáváním cyklosporinu A (CSA) v dávce udržující jeho endogenní hladinu mezi 100–200 µg/l. Denní dávka CSA má být velmi pozvolna snižována až po nejméně 12 měsících léčby. Ve skupině nemocných mladších 20 let přežívá 10 let po kombinované imunosupresi více než 80 % nemocných [16], u starších nemocných přežívá 10 let po imunosupresi 50–70 % nemocných [21,22]. V současnosti je dávana díky prokázané větší efektivitě přednost koňskému ATG před králíčím ATG [23]. Relaps po podání ATG se vyskytuje asi u 35 % nemocných [14], další riziko představuje možnost pozdního rozvoje klonální proliferace (MDS/AML u 15 % nemocných, hemolytická forma PNH u 10 % nemocných) [22,24]. Odpověď na 2. cyklus imunosuprese je přítomna u asi 35 % nemocných refrakterních na 1. cyklus a 55–60 % u relabujících nemocných. Současná léčebná doporučení dávají ve 2. linii léčby přednost transplantaci krvetvorných buněk, pokud má nemocný vhodného nepříbuzného dárce a nejsou přítomny kontraindikace SCT [14,16].

Od roku 2012 je studován vliv **eltrombopagu**, agonisty trombopoetinu (TPO) na obnovu krvetvorby u nemocných s AA [25]. TPO se váže na receptor, jenž je přítomen již na časných progenitorových buňkách krvetvorby a jeho přítomnost je nutná pro expanzi prekurzorů všech krvetvorných řad [26]. Na základě výsledků studie prokazujících efekt eltrombopagu u 40 % nemocných s AA (u 10 % nemocných ve více než jedné

Schéma. Současné léčebné postupy u těžké aplastické anémie. Přístupy označené přerušovanou čarou nejsou zatím podle současných doporučených léčebných postupů standardní

linii) [27] byl přípravek schválen k užití u nemocných se SAA refrakterních k imunosupresi a nevhodných k provedení SCT. Úvodní dávka přípravku činí 50 mg denně a je upravována ve 2týdenních intervalech podle efektu tak, aby byl zajištěn kontinuální vzestup počtu trombocytů $> 50 \times 10^9/l$. Závislost efektu eltrombopagu na iniciálním počtu retikulocytů ukazuje na nutnost přítomnosti určitého poolu reziduálních kmenových buněk pro efekt léku, obdobně jako u imunosupresivní terapie. Recentní studie ukázala na výrazný synergický efekt kombinovaného podávání imunosuprese a eltrombopagu, odpověď na léčbu byla přítomna u více než 90 % nemocných (z toho u 58 % nemocných ve všech řadách) [28]. Nepříznivým efektem léčby eltrombopagem může být kromě hepatotoxicity zvýšený výskyt aberací karyotypu, zejména monosomie chromosomu 7 [27].

Důležitou součástí terapie AA je **podpůrná léčba**. Spočívá v podávání **transfuzí erytrocytů a trombocytů** (u nemocných léčených imunosupresi či transplantovaných musí být ozářené), počet transfuzí erytrocytů je individuální a je závislý na klinickém stavu nemocného, hodnota počtu trombocytů pro indikaci podávání koncentráty se pohybuje mezi $10\text{--}20 \times 10^9/l$ a závisí na přítomnosti dalších faktorů (krvácivých projevů, současné léčbě, přítomnosti septických komplikací). Vzhledem k přítomnosti protražované neutropenie je u nemocných se SAA doporučováno profylaktické **podávání antibiotik a antimykotik**. Podávání koncentrátů granulocytů je většinou omezeno na těžké život ohrožující septické komplikace, podávání G-CSF (granulocyte colony stimulating factor/faktor stimulující granulocytární kolonie) leukocytů má u SAA omezený efekt díky chybění efektorových buněk. **Schéma** znázorňuje současný léčebný přístup k nemocným se SAA.

Literatura

1. Camitta BM, Rapoport JM, Parkman R et al. Selection of patients for bone marrow transplantation in severe aplastic anemia. *Blood* 1975; 45(3): 355–363.
2. Bacigalupo A, Hows J, Gluckman E et al. Bone marrow transplantation (BMT) versus immunosuppression for the treatment of severe aplastic anaemia (SAA): a report of the EBMT SAA working party. *Br J Haematol* 1988; 70(2): 177–182.
3. Young NS, Calado RT, Scheinberg P. Current concepts in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. *Blood* 2006; 108(8): 2509–2519. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2006-03-010777>>.
4. Calado RT, Young NS. Telomere diseases. *N Engl J Med* 2009; 361(24): 2353–2365. <<http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra0903373>>.
5. Young NS. Current concepts in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. *Hematology* 2014; Am Soc Hematol Educ Program 2014: 76–81. Dostupné z DOI: <<http://doi.org/10.1182/asheducation-2013.1.76>>.
6. Dameshek W. Riddle: what do aplastic anemia, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) and “hypoplastic” leukemia have in common? *Blood* 1967; 30(2): 251–254.
7. Tichelli A, Gratwohl A, Wursch A et al. Late haematological Complications in severe aplastic anaemia. *Br J Haematol* 1998; 69(3): 413–418.
8. Frickhofen N, Heimpel H, Kaltwasser JP et al. German Aplastic Anemia Study. G. Antithymocyte globulin with or without cyclosporin A: 11-year follow-up of a randomized trial comparing treatments of aplastic anemia. *Blood* 2003; 101(4): 1236–1242. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2002-04-1134>>.
9. Stanley N, Olson TS, Babushok DV. Recent advances in understanding clonal haematopoiesis in aplastic anaemia. *Br J Haematol* 2017; 177(4): 509–525. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1111/bjh.14510>>.
10. Maciejewski JP, Risitano AM, Nunez O et al. Distinct clinical outcomes for cytogenetic abnormalities evolving from aplastic anemia. *Blood* 2002; 99(9): 3129–3135.
11. Kulasekararaj AG, Jiang J, Smith AE et al. Somatic mutations identify a subgroup of aplastic anemia patients who progress to myelodysplastic syndrome. *Blood* 2014; 124(17): 2698–2704. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2014-05-574889>>.
12. Yoshizato T, Dumitriu B, Hosokawa K et al. Somatic mutations and clonal hematopoiesis in aplastic anemia. *N Engl J Med* 2015; 373(1): 35–47. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1414799>>.
13. Cooper JN, Young NS. Clonality in context: hematopoietic clones in their marrow Environment. *Blood* 2017; 130(22): 2363–2372. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-794362>>.
14. Kilick SB, Brown N, Cavenagh J et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of adult aplastic anemia. *Br J Haematol* 2016; 172(2): 187–207. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1111/bjh.13853>>. Erratum in Corrigendum. [Br J Haematol. 2016].
15. Afable MG, Tiu RV, Maciejewski JP. Clonal evolution in aplastic anemia. *Hematology* 2011; Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011: 90–95. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/asheducation-2011.1.90>>.
16. Bacigalupo A. How I treat aplastic anemia. *Blood* 2017; 129(11): 1428–1436. <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2016-08-693481>>.
17. Gupta V, Eapen M, Brazauskas R et al. Impact of age on outcomes after bone marrow transplantation for acquired aplastic anemia using HLA-matched sibling donors. *Haematologica* 2010; 95(12): 2119–2125. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2010.026682>>.
18. Locasciulli A, Oneto R, Bacigalupo A et al. [Severe Aplastic Anemia Working Party of The European Blood and Marrow Transplant Group]. Outcome of patients with acquired aplastic anemia given first line bone marrow transplantation or immunosuppressive treatment in the last decade: a report from the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). *Haematologica* 2007; 92(1): 11–18.
19. Bacigalupo A, Socie G, Schrezenmeier H et al. [Aplastic Anemia Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (WPSAA-EBMT)]. Bone marrow versus peripheral blood as the stem cell source for sibling transplants in acquired aplastic anemia: survival advantage for bone marrow in all age groups. *Haematologica* 2012; 97(8): 1142–1148. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2011.054841>>.
20. Bacigalupo A, Socie G, Hamladi RM et al. [Aplastic Anemia Working Party of the European Group for Blood Marrow Transplantation]. Current outcome of HLA identical sibling versus unrelated donor transplants in severe aplastic anemia: an EBMT analysis. *Haematologica* 2015; 100(5): 696–702. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2014.115345>>.
21. Bacigalupo A, Bruno B, Saracco P et al. [European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Working Party on Severe Aplastic Anemia and the Gruppo Italiano Trapianti di Midollo Osseo (GITMO)]. Antilymphocyte globulin, cyclosporine, prednisolone, and granulocyte colony-stimulating factor for severe aplastic anemia: an update of the GITMO/EBMT study on 100 patients. *Blood* 2000; 95(6): 1931–1934.
22. Scheinberg P, Young NS. How I treat acquired aplastic anemia. *Blood* 2012; 120(6): 1185–1196. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-12-274019>>.
23. Scheinberg P, Nunez O, Weinstein B et al. Horse versus rabbit antithymocyte globulin in acquired aplastic anemia. *N Engl J Med* 2011; 365(5): 430–438. <<http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa103975>>.
24. Rosenfeld SJ, Kimball J, Vining D et al. Intensive immunosuppression with Antithymocyte globulin and cyclosporine as treatment for severe acquired aplastic anemia. *Blood* 1995; 85(11): 3058–3065.
25. Olnes MJ, Scheinberg P, Calvo KR et al. Eltrombopag and improved hematopoiesis in refractory aplastic anemia. *N Engl J Med* 2012; 367(1): 1–11.

11–19. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1200931>>. Erratum in N Engl J Med 2012; 367(3): 284.

26. Marsh JCW, Mufti GJ. Eltrombopag, a stem cell cookie? Blood 2014; 123(12): 1774–1775. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2014-02-553404>>.

27. Desmond R, Townsley DM, Dumitriu B et al. Eltrombopag restores trilineage hematopoiesis in refractory severe aplastic anemia that can be sustained on discontinuation of drug. Blood 2014; 123(12): 1818–1825. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2013-10-534743>>.

28. Townsley DM, Scheinberg P, Winkler T et al. Eltrombopag added to standard immunosuppression for aplastic anemia. N Engl J Med

2017; 376(16): 1540–1550. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1613878>>.

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

✉ cermak@uhkt.cz

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

www.uhkt.cz

Doručeno do redakce 28. 12. 2017

Přijato po recenzi 15. 3. 2018

Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS
Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

XLI.
Endokrinologické dni
s medzinárodnou účasťou

11. - 13. október 2018
DoubleTree by Hilton, BRATISLAVA