Granulocytopenie

Jaroslav Čermák^{1,2}

¹Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK, Praha

²Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn

Granulocytopenie je definována jako snížení počtu granulocytů v periferní krvi pod dolní hranici normy. Při poklesu počtu neutrofilů $< 0,5 \times 10^9/l$ mluvíme o těžké granulocytopenii – agranulocytóze. Nedostatek granulocytů může být důsledkem vrozené či získané poruchy tvorby granulocytárních prekurzorů, zvýšený zánik granulocytů vzniká nejčastěji na podkladě imunitních mechanismů. Při hledání příčiny granulocytopenie je třeba odlišit celou řadu příčin vedoucích k sekundární granulocytopenii (infekce, systémová onemocnění, léky, LGL syndrom). Nemocní s počtem neutrofilů $> 0,5 \times 10^9/l$ většinou nemají klinické příznaky a nevyžadují léčbu, pokud není přítomno komplikující onemocnění, zejména imunodeficit. U těžké granulocytopenie je indikováno kromě podpůrné léčby podání G-CSF. Syndromy těžké kongenitální neutropenie (severe congenital neutropenia – SCN) jsou spojeny s rizikem rozvoje MDS a AML v pozdějším věku a nemocní jsou při známkách progresse onemocnění indikováni k transplantaci krevetvorných buněk (stem cell transplantation – SCT).

Klíčová slova: diagnostika – granulocytopenie – léčba – patogeneze – růstové faktory – transplantace

Granulocytopenia

Summary

Granulocytopenia is defined as a decrease of peripheral blood granulocytes below lower limit of normal range. Patients with severe granulocytopenia – agranulocytosis exhibit $< 0.5 \times 10^9/l$ granulocytes in peripheral blood. Granulocytopenia may result from congenital or acquired defective production of granulocyte precursors or it may be a consequence of increased destruction of mature granulocytes, most frequently caused by immune mechanisms. Investigation of origin of granulocytopenia must be connected with exclusion of etiological agents causing secondary neutropenia (infections, autoimmune disorders, drugs, LGL syndrome). Patients with $> 0.5 \times 10^9/l$ of granulocytes usually do not exhibit clinical symptoms unless they do not suffer from a concomitant disease (especially immunodeficiency). Patients with severe granulocytopenia are indicated for supportive treatment and for administration of G-CSF. Children with severe congenital neutropenia (SCN) are at risk of later development of MDS or AML and are candidates for SCT when signs of disease progression appears.

Key words: diagnosis – granulocytopenia – growth factors – pathogenesis – transplantation – treatment

Úvod

Granulocytopenii definujeme jako snížení počtu granulocytů (neutrofilů, eozinofilů, bazofilů) pod dolní hranici normy, jako neutropenii označujeme snížený počet neutrofilů (segmentů, tyčí). Nemocní s mírnou neutropenií mají počty neutrofilů mezi $1,0\text{--}1,5 \times 10^9/l$, středně těžká neutropenie je spojena s počty neutrofilů mezi $0,5\text{--}1,0 \times 10^9/l$, těžká neutropenie je definována poklesem počtu neutrofilů $< 0,5 \times 10^9/l$ [1]. Nemocní s počtem neutrofilů $> 0,5 \times 10^9/l$ většinou nemají klinické příznaky vyplývající z neutropenie, pokud není přítomno jiné komplikující onemocnění, zejména imunodeficit či celkově nepříznivý klinický stav.

Etiologie a patogeneze

Nedostatek granulocytů může být dán snížením tvorby či zvýšeným zánikem. Snížená tvorba bývá způsobena

absolutním poklesem produkce mladých forem granulocytů či tvorbou defektních prekurzorů podléhajících zvýšené apoptóze.

Vrozené poruchy tvorby granulocytů vznikají na podkladě mutace genů vedoucí k poruše proliferace granulocytárních řady a k předčasnému zániku granulocytárních prekurzorů. Nejčastější příčinou těžké vrozené neutropenie (**severe congenital neutropenia – SCN**) bývá mutace genu pro elastázu neutrofilů – *ELANE* gen, vzácněji o mutace jiných genů (*HAX1*, *WAS*). Mutace těchto genů vede k těžké poruše proliferace granulocytů se zástavou zrání na úrovni promyelocytů. Mechanismus vzniku granulocytopenie není zcela objasněn, předpokládá se, že kumulace volných proteinů v buňce vede k abnormálnímu buněčnému stresu, jež indukuje apoptózu prekurzorů [2]. Klinické projevy mutací *ELANE* a *HAX1* genu odpovídají tzv. **Kostmanovu syndromu** [3] s recidivujícími

infekty postihujícími kůži a sliznice (dutina ústní, nos, uši). Kromě klasické chronicky probíhající těžké vrozené neutropenie mohou mutace *ELANE* genu způsobovat i tzv. **cyklickou neutropenii** projevující se cykly neutropenie v intervalu asi 21 dnů. **Shwachmanův-Diamondův syndrom** vzniká v důsledku mutace *SBDS* genu. Tento gen je nutný pro normální metabolismus RNA, funkci a vazbu ribosomálních podjednotek, což jsou základní procesy nutné pro přežití granulocytárních prekurzorů [4]. Mutace *SBDS* genu je spojena se zvýšeným zánikem granulocytárních prekurzorů, selháním kostní dřeně s pancytopenií v krevním obraze, atrofií pankreatu s lipomatózou a retardací růstu s deformitami skeletu. K nepříznivé prognóze nemocných přispívá častý rozvoj myelodysplastického syndromu (MDS) a následný přechod do akutní myeloidní leukemie (AML) [5]. Ne zcela jasným mechanismem může vznikat neutropenie u některých **syndromů spojených s imunodeficiencí**, např. u běžného variabilního deficitu imunity (common variable immunodeficiency – CVID) či agamaglobulinemie vázané na X chromozom (XLA) [6].

Získané poruchy tvorby granulocytů jsou nejčastěji součástí syndromů selhání kostní dřeně – aplastické anémie (AA), myelodysplastického syndromu (MDS) či paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH). Na vzniku granulocytopenie se může podílet přímá toxicita způsobená určitou noxou, která vede k zániku granulocytárních prekurzorů, nebo může poškození vést k expresi abnor-

málních antigenů na povrchu granulocytů. To vede k aktivaci imunitních mechanismů, sekreci cytokinů aktivujících apoptózu a k aktivaci cytotoxických T-lymfocytů namířených proti prekurzorům granulocytů (obr). Obdobným mechanismem může vznikat granulocytopenie při některých infekcích (hepatitidy, HIV infekce) či po podání některých léků. Granulocytopenie může být i projevem některých dřeňových lymfoproliferací, zvláště jsou-li spojeny s hypoplazií a fibrózou dřeně (např. leukemie z vlasatých lymfocytů).

Zvýšený zánik granulocytů vzniká nejčastěji působením imunitních mechanismů. Předpokládá se, že na vzniku autoimunitní granulocytopenie se podílejí obdobné faktory jako u autoimunitní hemolýzy, tj. porucha prezentace autoantigenů imunokompetentním buňkám a porucha tolerance autoreaktivních T-lymfocytů. Důsledkem je indukce přeměny Th0 na Th1-lymfocyty a stimulace tvorby protilátek B-lymfocyty [7]. Protilátky se vážejí zejména na HNA1 (méně často na HN2 či HN5) antigen na povrchu granulocytů [8]. Následně dochází k fagocytóze granulocytů s navázanou protilátkou makrofágem po vazbě protilátky s Fcγ3b receptorem makrofágů. Komplex antigen-protilátka může vést i k aktivaci komplementu spojené s opsonizací s adhezencí neutrofilů [9]. Aktivace imunitního systému rovněž vede k sekreci cytokinů aktivujících apoptózu a k aktivaci cytotoxických T-lymfocytů (viz výše). Granulocytopenie může vznikat i v důsledku zvýšeného

Obr. Mechanismy podílející se na vzniku autoimunitní neutropenie.

Porucha prezentace a zpracování povrchových antigenů neutrofilů (HNA1, HNA2) vede spolu s poruchou tolerance autoreaktivních T-lymfocytů jednak k indukci cytotoxických T-lymfocytů namířených proti vlastním neutrofilům, jednak k sekreci cytokinů, které indukují apoptózu neutrofilů a současně tvorbu protilátek B-lymfocyty. Neutrofil s protilátkou navázanou na příslušné antigeny (HNA1, HNA2) či adhezanou na povrch neutrofilu ve formě imunitních komplexů jsou fagocytovány makrofágy. Zvýšená hladina volných kyslíkových radikálů (ROS) může přispívat k indukci tvorby protilátek.

odsunu z cirkulace (např. v důsledku zvýšeného vychytávání v místě zánětu) či marginace v orgánech (např. ve slezině). Niže je znázorněno v současnosti nejčastěji používané dělení granulocytopenií/neutropenií.

Základní dělení granulocytopenií/neutropenií podle příčiny

- **kongenitální neutropenie** (Kostmannův syndrom, Shwachmanův-Diamondův syndrom, vrozené imuno-deficitní stavy aj)
- **získané neutropenie** při postižení kmenové buňky (AA, MDS, PNH)
- **imunitně zprostředkované neutropenie** (aloimunitní neutropenie novorozenců, autoimunitní neutropenie – systémová onemocnění)
- neutropenie způsobená léky
- neutropenie při infekci
- **neutropenie při poruchách metabolismu** (deficit vitamínu B₁₂)
- neutropenie při LGL leukemii
- **chronická idiopatická neutropenie**

Diagnostika a diferenciální diagnostika

Schéma znázorňuje algoritmus vyšetřování nemocných s granulocytopenií [1]. V první fázi se vždy snažíme zjistit, zda granulocytopenie není projevem nějakého nehematologického onemocnění (systémová onemocnění, infekce – hepatitida, CMV infekce, HIV infekce, podání léku) [10]. Pokud se některá z těchto příčin nepotvrdí, je třeba provést vyšetření kostní dřeně (sternální punkce a trepanobiopsie), toto vyšetření nám může pomoci diagnostikovat některou z poruch kmenové krvetvorné buňky (AA, MDS), infiltraci dřeně lymfoproliferací (leukemie z vlas-

tých lymfocytů), u dětí je třeba se zaměřit zejména u dlouhotrvající neutropenie s hypoplazií granulopoézy v kostní dřeni na některý z vrozených syndromů spojených s granulocytopenií (rodinná anamnéza, molekulárně genetické vyšetření). Pokud je nález v kostní dřeni nesignifikantní, je vhodné znovu pátrat po možné spojitosti s infekcí či s podáváním léku a vyšetřit možnou přítomnost protilátek proti granulocytům. Přítomnost granulocytárních protilátek potvrzuje diagnózu autoimunitní granulocytopenie, negativita testu ale autoimunitní příčinu zcela nevylučuje. V případě nepřítomnosti granulocytárních protilátek je vhodné vyšetření periferní krve pomocí průtokové cytometrie k vyloučení tzv. leukemie z velkých granulárních lymfocytů (LGL leukemie). V **tab. 1** jsou uvedeny základní anamnestické údaje a klinická vyšetření, která by neměla být opomínuta při podezření na granulocytopenii, v **tab. 2** je pak souhrn základních laboratorních vyšetření užívaných v diagnostice a diferenciální diagnostice granulocytopenie.

K vyšetření granulocytárních protilátek je používána řada testů: granulocytární cytotoxický test (GCT), granulocytární aglutinační test (GAT), granulocytární imuno fluorescenční test (GIFT) přímý či nepřímý s detekcí pomocí mikroskopu či průtokového cytometru a MAIGA test (imobilizace granulocytárních antigenů pomocí specifické monoklonální protilátky), žádný z testů však není schopen identifikovat všechny klinicky relevantní protilátky.

Základní klinické jednotky a léčba

Léčba granulocytopenie se odvíjí od klinických projevů a průběhu onemocnění. Určujícími faktory jsou hloubka

Schéma. Algoritmus vyšetřování neutropenie dospělých

granulocytopenie, rychlost jejího vzniku a délka trvání, vyvolávající příčina a přítomnost komorbidit (zejména imunodeficitu). Při mírné a středně těžké neutropenii (počet neutrofilů $> 0,5 \times 10^9/l$) většinou chybí klinické příznaky, pokud není přítomen současný imunodeficit. Příznaky a průběh bývají závažnější při stavech se sníženou tvorbou granulocytů než u stavů, v nichž je přítomen jejich zvýšený zánik.

Nemocní s počtem neutrofilů $> 0,5 \times 10^9/l$ většinou nevyžadují léčbu, pokud nejsou přítomny komplikace. Pro nemocné s počtem neutrofilů $< 0,5 \times 10^9/l$ je lékem volby **granulocyty stimulující faktor (G-CSF)**, zejména pokud je přítomna komplikující infekce. Iničiální dávka většinou činí 1–3 $\mu g/kg/den$, tuto dávku lze zvyšovat až na 20–30 $\mu g/kg/den$, při dobrém efektu je nutno klesat na minimální udržovací dávku. Pokud není trvalejší efekt dávek 10 $\mu g/kg/den$ a vyšších, je nutná jiná léčba, zejména u kongenitální neutropenie pak alogenní transplantace krvetvorných buněk (SCT). G-CSF má efekt i u autoimunitní neutropenie. **Podpůrná léčba** spočívá v podávání širokospektrých antibiotik při komplikující infekci, podávání imunosupresiv s doporučuje v rámci léčby vyvolávajícího onemocnění, pokud vyžaduje imunosupresi, paušální podávání kortikosteroidů se nedoporučuje.

Vrozené syndromy selhání krvetvorby spojené s granulocytopenií

Těžká **kongenitální neutropenie (SCN)** se projevuje recidivujícími infekty postihujícími kůži a sliznice (dutina ústní, nos, uši). Metodou volby pro nemocné je podávání G-CSF, dávkování a frekvence podávání by měly vést k trvalému vzestupu počtu granulocytů $> 1,0 \times 10^9/l$, tento počet by měl být dostatečný pro prevenci vzniku recidivujících infekcí. Jako rezistence na léčbu je považována nutnost zvyšování dávky G-CSF nad 120 $\mu g/kg/den$ [3]. Část těchto nemocných může odpovídat na kombinaci

G-CSF a SCF (stem cell faktor). Podávání G-CSF prodloužilo délku života nemocných se SCN o 20 let [11], nicméně, analýza dlouhodobého podávání G-CSF 374 nemocným se SCN prokázala zvýšenou incidenci AML (rozvoj u 22 % nemocných během 15 let) [12]. Incidence byla vyšší u nemocných, kteří dostávali $> 8 \mu g$ G-CSF/kg/den – 34 % vs 15 % u nemocných s nižší denní dávkou. Nebyl pozorován rozdíl mezi typy mutace *ELANE* genu, analýza nemocných z německého SCN registru však ukázala vysokou incidenci mutace receptoru pro G-CSF (CSF3R) u nemocných se SCN léčených G-CSF, u kterých se rozvinul MDS/AML (78 % nemocných vs 35 % nemocných, u nichž nedošlo k progresi směrem k AML) [13]. Negativní význam přítomnosti mutace CSF3R je zřejmě dán schopností autoaktivity a hyperproliferační progenitorů nezávisle na růstových faktorech díky poruše endocytózy receptoru, k prolongované aktivaci STAT5 a zvýšené produkci volných kyslíkových radikálů [11]. Recentní mutační analýza nemocných z Mezinárodního SCN registru [14] ukázala vysokou incidenci mutace *RUNX1* genu (64,5 %) u nemocných se SCN, 80,5 % těchto nemocných mělo současně mutaci *CSF3R*. Mechanismus možné synergie obou mutací je zkoumán, mutace *RUNX1* je zřejmě následnou mutací aktivující funkci tohoto genu jako transkripčního faktoru. Alogenní transplantace krvetvorných buněk (SCT) je alternativním léčebným přístupem k nemocným nereagujícím na podávání G-CSF, je však třeba vždy zvážit rizika spojená se SCT (i když je dnes doporučován redukováný přípravný režim) s riziky vyplývajícími z konkrétního stavu nemocného. Nemocní se **Shwachmanovým-Diamondovým syndromem** nemusí mít výraznější klinické potíže, při těžší formě granulocytopenie je indikováno intermitentní podávání G-CSF. Nemocné je však třeba pečlivě sledovat včetně opakovaného vyšetření kostní dřeně, progredující cytopenie se známkami dysplazie v kostní dřeni je indikací k alogenní

Tab. 1. Základní anamnestické údaje a klinická vyšetření v diagnostice granulocytopenie

diagnostika granulocytopenie	
základní anamnestické údaje	Je neutropenie součástí akutního onemocnění či jde o asymptomatický nálezy při rutinním vyšetření krevního obrazu?
	Jsou dostupné starší nálezy v krevním obraze k posouzení délky trvání neutropenie?
	Jaký je klinický podklad – infekce, podání léku? Je přítomno autoimunitní onemocnění? Jde o novorozence? Je nemocný léčen chemoterapií?
	Jaký je klinický projev – teplota, slizniční ulcerace, gingivitis, celulitis, abscesy (zejména periproktální), pneumonie, sepse?
	Má podobné potíže někdo ze členů rodiny?
základní klinická vyšetření	vyšetření možných infekčních ložisek (kůže, respirační trakt, GIT – konečník)
	vyřazení/potvrzení lymfadenopatie, hepatosplenomegalie
	vyšetření možných vrozených abnormalit

Tab. 2. Laboratorní vyšetření v diagnostice granulocytopenie

základní	vyšetření krevního obrazu: počet všech elementů, vyšetření diferenciálu
	základní biochemické vyšetření včetně CRP a FW
	odlišení základních možných příčin neutropenie: akutní poléková neutropenie, akutní febrilní neutropenie po chemoterapii, SCN (těžká kongenitální neutropenie) s infekcí, chronická mírná neutropenie
speciální	vyšetření protilátek proti neutrofilům
	vyšetření ANF, anti ds-DNA
	vyšetření periferní krve pomocí FCM – vyloučení LGL syndromu
	vyšetření hladiny vitamínu B ₁₂
	vyšetření mutací typických pro SCN (<i>ELANE</i> , <i>HAX-1</i> , <i>WAS</i> geny)
	vyšetření sternální punkce a trepanobiopsie kostní dřeně k vyloučení aplastické anémie, MDS, akutní leukemie, leukemie z vlasatých lymfocytů

SCT, zejména pokud dochází k nárůstu počtu blastů ve dření a jsou přítomny nepříznivé změny karyotypu (monosomie 7, delece 7q) [4]. Alogenní SCT je metodou volby i u SCN při známkách progresu směrem k AML.

Autoimunitní granulocytopenie

Jak již bylo výše zmíněno, autoimunitní granulocytopenie je způsobena tvorbou protilátek proti granulocytům, na jejím vzniku se podílí i zvýšená sekrece cytokinů indukujících apoptózu cílových buněk (Fas ligand) a tvorbu cytotoxických T-lymfocytů. Autoimunitní granulocytopenie se nejčastěji vyskytuje u systémových onemocnění, může být přítomna až u 50 % nemocných se systémovým **lupus erythematosus**, při němž bývá často spojena s cytopenií v jiných řadách (anémie, trombocytopenie, lymfopenie). Granulocytopenie na autoimunitním podkladě může být přítomna až u 30 % nemocných s **revmatoidní artritidou a Sjögrenovým syndromem**, hloubka cytopenie často souvisí s tíží choroby [15]. Kromě léčby základního onemocnění je možno u těžších forem granulocytopenie podávat G-CSF, metotrexát a cyklosporin A ovlivňují tvorbu Fas ligand. U některých nemocných s revmatoidní artritidou však může podávání G-CSF zhoršovat kloubní obtíže.

Neutropenie při infekci

Neutropenie může vznikat u infekce toxickým poškozením prekurzorů, v důsledku inkorporace viru do DNA dojde k apoptóze postižené buňky. Tímto způsobem vzniká neutropenie u infekční hepatitidy, infekce EBV či HIV. Zvýšená sekrece cytokinů u bakteriálních infekcí vede k aktivaci komplementu s indukci migrace neutrofilů do místa zánětu, u některých jiných infekcí (*Rickettsie*, *Bartonella*, některé viry) může aktivace komplementu indukovat adhezi neutrofilů k endotelu poškozenému infekcí. U chronických infekcí (tyfus, brucelóza, malárie) může docházet k marginaci neutrofilů ve slezině. Léčba granulocytopenie souvisí s léčbou vyvolávajícího infektu, u těžké granulocytopenie lze podávat G-CSF [8].

Neutropenie indukovaná léky

Incidence neutropenie vyvolané léky se pohybuje mezi 0,3–1,2/100 000 obyvatel. Toxický účinek léku, který vede k poškození proteosyntézy nebo buněčného dělení, je závislý na jeho dávce a vlastním mechanismem je nejčastěji indukce tvorby volných hydroxylových radikálů či produkce toxických metabolitů s následnou apoptózou poškozené buňky. V případě idiosyncrazie jde o alergickou reakci, která není závislá na dávce léku a většinou se jedná o indukci tvorby protilátek v důsledku modifikace povrchových antigenů granulocytů či o tvorbu imunitních komplexů. Nejčastěji bývá těžká forma neutropenie popisována po podání některých antibiotik a chemoterapeutik (chloramfenikol, trimetoprim-sulfametoxazol, vankomycin), sulfasalazinu, tiklopidinu, prokainamidu, klopazinu a některých tyreostatik [10]. Neutropenie odeznívá většinou za 4–7 dní po

vysazení léku, současně je třeba podávat podpůrnou léčbu a v těžších případech G-CSF.

Neutropenie u LGL syndromu

LGL syndrom se dříve nazýval leukemie z velkých granulárních lymfocytů. Jde o primárně reaktivní polyclonální či oligoklonální expanzi cytotoxických T-lymfocytů, která vzniká jako reakce na noxu (antigenní podnět), následná monoklonální expanze je zřejmě dána overexpresí STAT3, jenž má antiapoptotický efekt a aktivací Src kináz [16]. Neutropenie u LGL syndromu je dána jednak přímou cytotoxicitou zprostředkovanou cytotoxickými T-lymfocyty či indukci apoptózy neutrofilů produkovanými cytokiny (Fas-L, IFN, TNF). Onemocnění se často sdružuje s revmatoidní artritidou a je významná asociace s přítomností HLA-DR4. Léčba se odvíjí od stupně klinických příznaků, při těžším průběhu je ke korekci neutropenie indikován G-CSF, těžší formy LGL syndromu se léčí podáváním imunosupresiv (metotrexát, cyklofosfamid, cyklosporin A), zkouší se podávání inhibitorů STAT3 či Fas-L [10].

Chronická idiopatická neutropenie

Chronická idiopatická neutropenie postihuje většinou ženy mezi 20.–40. rokem věku. Jedná se o izolovanou neutropenii různého stupně, někdy společně s přítomností lymfopenie. Klinické příznaky závisí na stupni neutropenie, většinou jde o opakované epizody zvýšené teploty, bolesti v krku, únavu a bolesti ve svalu. Příčinou je zvýšená sekrece cytokinů (IFN, Fas) indukujících apoptózu neutrofilů [10]. Průběh je většinou benigní, u nemocných s výraznou granulocytopenií a známkami opakovaných infekcí je možno aplikovat G-CSF. Je nutno zdůraznit, že diagnózu chronické idiopatické neutropenie můžeme stanovit až po pečlivém a opakovaném vyloučení jiné příčiny chronické neutropenie, zejména systémového onemocnění, MDS či LGL syndromu.

Literatura

1. Palmblad J, Dufour C, Papadaki H. How we diagnose neutropenia in the adult and elderly patient. *Haematologica* 2014; 99(7): 1130–1133. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2014.110288>>.
2. Horwitz MS, Corey SJ, Grimes HL et al. ELANE mutations in cyclic and severe congenital neutropenia: genetics and pathophysiology. *Hematol Oncol Clin North Am* 2013; 27: 19–41. vii. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.hoc.2012.10.004>>.
3. Zeidler C, Welte K. Kostmann syndrome and severe congenital neutropenia. *Semin Hematol* 2002; 39(2): 82–88.
4. Smith OP. Shwachman-Diamond syndrome. *Semin Hematol* 2002; 39(2): 95–102.
5. Freedman M, Alter BP. Risk of myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia in congenital neutropenias. *Semin Hematol* 2002; 39(2): 128–133.
6. Cham B, Bonilla MA, Winkelstein J. Neutropenia associated with primary immunodeficiency syndromes. *Semin Hematol* 2002; 39(2): 107–112.
7. Papadaki H, Eliopoulos AG, Kostas T et al. Impaired granulocytopoiesis in patients with chronic idiopathic neutropenia is associated with increased apoptosis of bone marrow myeloid progenitor

cells. *Blood* 2003; 101(7): 2591–2600. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2002-09-2898>>.

8. Palmblad JEW, von dem Borne AE. Idiopathic, immune, infectious, and idiosyncratic neutropenias. *Semin Hematol* 2002; 39(2): 113–120.

9. Newburger PE, Dale DC. Evaluation and management of patients with isolated neutropenia. *Semin Hematol* 2013; 50(3): 198–206. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1053/j.seminhematol.2013.06.010>>.

10. Gibson C, Berliner N. How we evaluate and treat neutropenia in adults. *Blood* 2014; 124: 1251–1258; quiz 1378. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2014-02-482612>>.

11. Touw IP. Game of clones: the genomic evolution of severe congenital neutropenia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2015; 2015: 1–7. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/asheducation-2015.1.1>>.

12. Rosenberg PS, Zeidler C, Bolyard AA et al. Stable long-term risk of leukaemia in patients with severe congenital neutropenia maintained on G-CSF therapy. *Br J Haematol* 2010; 150(2): 196–199. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.2010.08216.x>>.

13. Germeshausen M, Ballmaier M, Welte K. Incidence of CSF3R mutations in severe congenital neutropenia and relevance for leukemogenesis: results of a long-term study. *Blood* 2007; 109(1): 93–99. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2006-02-004275>>.

14. Skokowa J, Steinemann D, Katsman-Kuipers H et al. Cooperativity of RUNX1 and CSF3R mutations in severe congenital neutropenia: a unique pathway in myeloid leukemogenesis. *Blood* 2014; 123(14): 2229–2237. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/blood-2013-11-538025>>.

15. Starkebaum G. Chronic neutropenia associated with autoimmune disease. *Semin Hematol* 2002; 39(2): 121–127.

16. Zhang D, Loughran TP Jr. Large granular lymphocytic leukemia: molecular pathogenesis, clinical manifestations, and treatment. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2012; 2012: 652–659. Dostupné z DOI: <<http://dx.doi.org/10.1182/asheducation-2012.1.652>>.

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

✉ cermak@uhkt.cz

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

www.uhkt.cz

Doručeno do redakce 3. 12. 2017

Přijato po recenzi 15. 3 2018