

Ezetimib STADA



SNIŽUJE LDL-CHOLESTEROL

- Účinný inhibitor intestinálního vstřebávání cholesterolu
- Podávání ezetimibu vede ke snížení hladiny celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu a ke zvýšení hladiny HDL-cholesterolu
- Pro prevenci kardiovaskulárních příhod
- Vhodný do kombinace se statinem nebo k monoterapii
- Je na Pozitivním listu VZP a je bez doplatku pacienta

Zkrácená informace o přípravku Ezetimib STADA 10 mg tablety

Indikační skupina: jiná léčiva ovlivňující hladinu lipidů. **Složení:** ezetimibum 10 mg v jedné tabletě. **Indikace:** primární hypercholesterolemie. Přípravek podávaný spolu s inhibitorem reduktázy HMG-CoA (statinem) je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní familiární nebo nefamiliární) hypercholesterolemií, u kterých není dostatečná odpověď na léčbu samotným statinem. V monoterapii je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární hypercholesterolemií, u kterých je statin považován za nevhodný nebo není tolerován. Prevence kardiovaskulárních příhod: ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a s anamnézou akutního koronárního syndromu, pokud je jeho podávání přidáno k již probíhající léčbě statinem nebo je podávání ezetimibu zahájeno současně se statinem. Homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH): spolu se statinem je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s HoFH. Pacienti mohou dostávat i přídatnou terapii (např. aferézu LDL). **Dávkování a způsob podání:** jedna tableta ezetimibu 10 mg denně, může být podáván kdykoli během dne, s jídlem nebo na lačno. Pokud je ezetimib přidán ke statinu, mělo by se pokračovat v podávání již stanovené dávky statinu. U pacientů s ischemickou chorobou srdeční a s anamnézou akutního koronárního syndromu má být ezetimib 10 mg podáván společně se statinem s prokázaným kardiovaskulárním přínosem. Perorální podání. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Pokud je ezetimib podáván spolu se statinem, postupujte dle SPC. Terapie ezetimibem v kombinaci se statinem je kontraindikována během těhotenství a kojení. Podávání ezetimibu spolu se statinem je kontraindikováno u pacientů s aktivním jaterním onemocněním nebo nevysvětleným přetrvávajícím zvýšením sérových transamináz. **Významné interakce:** fibráty mohou zvýšit vylučování cholesterolu do žluče, které vede k cholelitiáze. Opatrnosti je potřeba u současného podávání cyklosporinu, antacid, kolestyraminu, statinů, antikoagulancií, podrobněji viz SPC bod 4.5. **Hlavní nežádoucí účinky:** únava, bolest hlavy, zvýšení hladiny ALT/AST, myalgie, bolest břicha, průjem, nadýmání. **Těhotenství a kojení:** Ezetimib by měl být podáván těhotným ženám, pouze pokud je to nezbytně nutné. Ohledně použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Ezetimib nesmí být užíván během kojení. **Upozornění:** pokud se ezetimib podává společně se statinem, musí se provést testy jaterních funkcí při zahájení terapie. Všechny pacienty je nutno upozornit na riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli tento přípravek užívat. **Balení na trhu:** 30 a 98 tablet **Uchovávání:** v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. **Datum poslední revize textu:** 28. 2. 2019. **Registrační číslo:** 31/389/16-C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** STADA Arzneimittel AG, Německo.

Před předepsáním přípravku se seznámte s úplným souhrnem údajů o přípravku. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.