

**Pomozte lidem s nadváhou
a obezitou žít**

a obezitou žít

LEHČÍ ŽIVOT¹

s Wegovy®

Wegovy® přináší kvalitní redukci tělesné hmotnosti a jako jediné antiobezitikum prokazatelně snižuje KV riziko u lidí s nadváhou a obezitou bez diabetu.^{1-4*}

ÚČINNOST²

-21%

průměrná redukce
tělesné hmotnosti^{2,†}



KVALITA*

Ze správných míst

84%

z tukové hmoty^{4§}



KV PŘÍNOSY

20%

snížení rizika KV příhod u pacientů s KVO^{#1,3}

Informace
o cenách Wegovy®
naleznete zde:



BMI - body mass index; KV - kardiovaskulární; KVO - kardiovaskulární onemocnění; Přípravek není hrazený z veřejného zdravotního pojištění; Pacient je modelový, nejedná se o reálného pacienta.

1. Příprava léčebny – je schválen výhradně pro léčbu obézit a nadměrné, jeho použití k léčbě přidružených onemocnění není indikováno. „Kvalitní rozdíly tělesné hmotnosti“ v kontextu tohoto dokumentu označuje úbytek tělesné hmotnosti, který vede ke zlepšení ve složení těla a zachová svalovou funkci, což podporuje lepší fyzické fungování a lepší kvalitu života. U pacientů bez diabetu s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním a BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ a 140% standardní léčbou. • Od výše uvedených hodnoty do 72 týdne. STEP UP byla studie fáze 3b, randomizovaná, dvojité zaslepená, placebem a aktivní léčbou kontrolovaná, tříletá klinická studie s délkou léčby 72 týdnů a 31 týdnem sledování po ukončení léčby. Studie zahrnovala 1 407 dospělých s BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ bez diabetu. Pacienti postupovali podle režimu postupného navyšování dávky. Ve 20. týdně přišli na své údržovací dávky 72 mg, 2,4 mg nebo placebo. Kopírnými dle ukazatele byly procentuální změna tělesné hmotnosti a procentuální změna tělesné hmotnosti u pacientů, kteří dosáhli snížení tělesné hmotnosti o 5 % při léčbě Wegovy 7,2 mg ve srovnání s placebem. 2 Údaje prezentované zde ze studie STEP UP vycházejí z odhadu „trial product estimand“, který popisuje efekt léčby za předpokladu, že všichni pacienti léčbu dodržovali, naproti tomu primární „treatment policy estimand“ popisuje efekt léčby bez ohledu na adherence. Při použití treatment policy estimandu dosáhli pacienti léčby Wegovy 7,2 mg superiorního snížení tělesné hmotnosti o 18,7 % ve srovnání s placebem o 15,6 % při léčbě: „STEP UP“ 2,4 mg a 3,9 % při placebo. 3 Uvedené výsledky pocházejí z analýzy souboru dat k přípravku Wegovy v dávkách 2,4 mg a 7,2 mg. Změna tělesné hmotnosti jako procento tělesné hmotnosti byla vypočtena jako: $(\text{absolutní změna objemu} / \text{BMI} \text{ (týkové kg/m}^2) \times 0,92) / (\text{absolutní změna objemu} / \text{BMI} \text{ (týkové kg/m}^2) + (\text{absolutní změna objemu} / \text{BMI} \text{ (týkové kg/m}^2) \times 1,1)) + 100 = ((11,0 \times 0,92) / (11,0 \times 0,92) + (12,1 \times 1,1)) \times 100 = 84,4 \%$

Zkrácená informace o léčivém přípravku Wegow® 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg, 2,4 mg FlexTouch®; Wegow® 7,2 mg injekční roztok v předplněném peru

▼ Tento liečivý prípravok podľehá ďalšiemu sledovaniu. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Žiadame zdravotníckych pracovníkov, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiadúce účinky. Podrobnosti o hlásení nežiadúcich účinkov viz SPC, bod 4.8

[illegible]

Reference: 1. SPC přípravku Wegovy®. 2. Wharton S, Freitas P, Hjelmseth J et al. Once-weekly semaglutide 7.2 mg in adults with obesity (STEP UP): a randomised, controlled, phase 3b trial *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 2025; 13, 949-963. 3. Lincoff AM, Brown-Franden K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. *N Engl J Med*. 2023;389(24):2221-2232. 4. Hjelmseth J, Bhat S, Garvey WT, et al. Effect of semaglutide on body composition and proximal muscle strength: the STEP UP trial. Presented at: The 61st European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting, September 15-19, 2025; Vienna, Austria.